

# 泌尿器科腫瘍

# 前立腺癌 ドセタキセル療法

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1
DIV	生理食塩液注 250 ml ドセタキセル注 75 mg/m <sup>2</sup>	60分 250 ml/時	↓

インターバル日数 21日

# 尿路上皮癌 ドセタキセル療法

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1
DIV	生理食塩液注 250 ml ドセタキセル注 70 mg/m <sup>2</sup> (減量可)	60分 250 ml/時	↓

インターバル日数 21日

# 前立腺癌 カバジタキセル単剤療法

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1	Day 1-21
PO	プレドニン錠5mg 10mg/day	朝・昼 分2		→
DIV	生理食塩液注 250ml ジェブタナ点滴静注 25mg/m <sup>2</sup>	60分 250 ml/時	↓	

ジェブタナ注にはフィルター必要

インターバル日数 21日

泌尿器科腫瘍 25 根治切除不能/転移性 腎細胞癌(1次治療)

アベルマブ+アキシチニブ併用療法

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1	Day 1-14
PO	インライタ錠 10mg/day	朝・夕 分2		→
DIV	バベンチオ点滴静注 10mg/kg 生理食塩液注 250mL	60分 250ml/時	↓	

\* IMDCリスク分類は問わない。

\* バベンチオは調製後4時間以内に投与を完了する。

\* バベンチオは、0.2µmのインラインフィルターを通して投与する。

\* インライタは患者の状態により適宜増減するが、最大20mg/dayまで増量できる。

インターバル: 14日間

# 泌尿器科腫瘍 26 根治切除不能/転移性 腎細胞癌(1次治療)

## ペムブロリズマブ+アキシチニブ併用療法

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1	Day 1-21
PO	インライタ錠 10mg/day	朝・夕 分2		→
DIV	キイトルーダ点滴静注 200mg/body 生理食塩液注 50mL	30分 100ml/時	↓	

\* IMDCリスク分類は問わない。

\* ペムブロリズマブはインラインフィルター(0.2-5 $\mu$ m)を使用して投与。

\* インライタは患者の状態により適宜増減するが、最大20mg/dayまで増量できる。

インターバル:21日間