

# 腦腫瘍

悪性神経膠腫  
 テモゾロミド内服 + ベバシズマブ療法(維持療法)

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1	Day 1-5	Day 15
PO	テモダールカプセル 100-200 mg/m <sup>2</sup>	空腹時		→	
DIV	アバスチン注 10 mg/kg 生理食塩液注 100 ml (全部で100 ml)	初回:67 ml/時;90分 2回目:100 ml/時;60分 3回目以降:200 ml/時;30分	↓		↓

- テモダールは必ず空腹時に服用し(少なくとも4時間以上の絶飲食)、服用後2時間は飲食を控える
- テモダールは1サイクル目150 mg/m<sup>2</sup>、2サイクル目以降200 mg/m<sup>2</sup>
- テモダール内服はDay 2-6への変更可
- アバスチン投与時間は、初期治療後の維持療法であれば初回から200 ml/時(30分)で可

インターバル日数 28日

**悪性神経膠腫**  
**テモゾロミド内服 + ベバシズマブ療法(初期治療)**

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1	Day 15	Day 29	Day 42	Day 1-3	Day 4-42	Day (43-49)
PO	テモダールカプセル 75 mg/m <sup>2</sup>	空腹時					→	→	(→)
DIV	アバスチン注 10 mg/kg 生理食塩液注 100 ml (全部で100 ml)	初回:67 ml/時;90分 2回目:100 ml/時;60分 3回目以降:200 ml/時; 30分	↓	↓	↓	↓			
DIV	生理食塩液注 50 ml	6分 500 ml/時	↓	↓	↓	↓			

- テモダール休薬後の再開時にはセロトニン受容体拮抗薬を3日間内服する
- テモダールは必ず空腹時に服用し(少なくとも4時間以上の絶飲食)、服用後2時間は飲食を控える
- 本レジメンは原則として放射線治療期間中(Day 1-42)の投与とし、投与期間の延長は最大49日とする
- セロトニン受容体拮抗薬は症状に応じてDay 4-49についても投与可

**インターバル日数 42-49日**