

耳鼻咽喉科腫瘍

頭頸部癌 ドセタキセル療法

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1
DIV	生理食塩液注 250 ml ドセタキセル注 70 mg/m ² (減量可)	60分 250 ml/時	↓

インターバル日数 21日

頭頸部癌

セツキシマブ単剤療法(初回)

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1
DIV	生理食塩液注 500 ml アービタックス 400 mg/m ² (全量を500mlに調製)	120分 250 ml/時	↓

過去にインフュージョンリアクション(軽度を含む)を認めた患者では、添付文書に従い投与を減速(125ml/時)するとともに、投与後1時間は経過観察する(例:生食250mlを点滴)

インターバル日数 7日

頭頸部癌 セツキシマブ単剤療法(2回目以降)

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1
DIV	生理食塩液注 250 ml アービタックス 250 mg/m ² (全量を250mlに調製)	60分 250 ml/時	↓

過去にインフュージョンリアクション(軽度を含む)を認めた患者では、添付文書に従い投与を減速(125ml/時)するとともに、投与後1時間は経過観察する(例:生食250mlを点滴)

インターバル日数 7日

耳鼻咽喉科腫瘍 9

頭頸部癌: セツキシマブ+シスプラチン+5-FU療法(初回)

投与方法	薬剤	投与時間	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 9	Day 16
DIV	生理食塩液注 500 ml アービタックス 400 mg/m ² (全量を500mlに調製)	120分 250 ml/時	↓						
DIV	生理食塩液注 500ml シスプラチン点滴静注液 80mg/m ²	2時間 流速を算出 すること	↓						
DIV	生理食塩液注 1000ml フルオロウラシル注 700mg/m ²	24時間 42ml/時	→	→	→	→	→		
DIV	生理食塩液注 250 ml アービタックス 250 mg/m ² (全量を250mlに調製)	60分 250 ml/時						↓	↓

インターバル日数 21日

頭頸部癌：セツキシマブ+シスプラチン+5-FU療法(2回目以降)

投与方法	薬剤	投与時間	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 9	Day 16
DIV側管	生理食塩液注 250 ml アービタックス 250 mg/m ² (全量を250mlに調製)	60分 250 ml/時	↓					↓	↓
DIV側管	生理食塩液注 500ml シスプラチン点滴静注液 80mg/m ²	2時間 流速を算出すること	↓						
DIV	生理食塩液注 1000ml フルオロウラシル注 700mg/m ²	24時間 42ml/時	→	→	→	→	→		

インターバル日数 21日

頭頸部癌

パクリタキセル＋セツキシマブ併用療法(2回目以降)

シスプラチンが使用できない症例に限り適用すること

投与方法	薬剤	投与時間	Day 1
DIV	生理食塩液注 250 ml アービタックス 250 mg/m ² (全量を250mlに調製)	60分 250 ml/時	↓
DIV	生理食塩液注 250 ml パクリタキセル注 80 mg/m ²	60分 流速を算出すること	↓

パクリタキセル注にはフィルター必要

過去にインフュージョンリアクション(軽度を含む)を認めた患者では、添付文書に従い投与を減速(125ml/時)するとともに、投与後1時間は経過観察する(例:生食250mlを点滴)

インターバル日数 7日