

胚細胞腫瘍

胚細胞腫瘍 BEP療法

	投与方法	薬剤	投与時間	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 9	Day 16
①	DIV	ソルデム3A 500 2000 ml メイロン8.4% 注 60 ml	24時間 86 ml/時間	→	→	→	→	→		
②	DIV	生理食塩液注 50 ml セロトニン受容体拮抗薬 デキサート注 6.6 mg アプレピタント125mg内服	15分 200 ml/時間	↓						
		生理食塩液注 50 ml デキサート注 3.3mg アプレピタント80mg内服	15分 200 ml/時間		↓	↓	↓	↓		
③	DIV	エトポシド点滴静注液 100 mg/m ² 5%ブドウ糖500mL (0.4mg/mL以下の濃度に調製)	2時間 250ml/時間	↓	↓	↓	↓	↓		
④	DIV	シスプラチン点滴静注液 20 mg/m ² 生理食塩液テルパック 500 ml	2時間 流速を算出すること	↓	↓	↓	↓	↓		
⑤	DIV	マンニトール注 150 ml	1時間 150 ml/時間	↓	↓	↓	↓	↓		
⑥	DIV	生理食塩液注 50 ml セロトニン受容体拮抗薬 (削除可) デキサート注 6.6 mg (削除可)	15分 200 ml/時間						↓	↓
⑦	DIV	ブレオ 30mg/body 生理食塩液注 50ml	15分 200 ml/時間		↓				↓	↓
⑧		生理食塩液注 50 ml	6分 500ml/時						↓	↓

胚細胞腫瘍 PVB療法

	投与方法	薬剤	投与時間	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 9	Day 16
①	DIV	ソラクト 1000 ml KN3号輸液 500 ml	タより 70 ml/時	→							
②	DIV	ソラクト 1000 ml KN3号輸液 500 ml	24時間		→	→	→	→	→		
③	DIV 側管	生理食塩液注 50 ml デキサート 6.6 mg セロトニン受容体拮抗薬	30分 100 ml/時		↓	↓	↓	↓	↓		
④	DIV 側管	生理食塩液注 500 ml シスプラチン点滴静注液 20 mg/m ²	2時間 250 ml/時		↓	↓	↓	↓	↓		
⑤	DIV 側管	生理食塩液注 50 ml エクザール 0.15 mg/kg	30分 100 ml/時		↓	↓					
⑥	DIV	生理食塩液注 50 ml セロトニン受容体拮抗薬 (削除可) デキサート注 6.6 mg (削除可)	15分 200 ml/時 間							↓	↓
⑦	DIV	生理食塩液注 50 ml ブレオ 20 mg/m ²	30分 100 ml/時			↓ 側管				↓	↓
⑧	DIV	生理食塩液注 50 ml	6分 500 ml/時							↓	↓

*ブレオは総投与量が300mgを越えないこと (胚細胞腫瘍では360mgを越えないこと)