


31 手術あり患者の肺塞栓症の発生率

| 解説 | 肺塞栓症は血栓(血のかたまり)が肺動脈に詰まり,呼吸困難や胸痛を引き起こす疾患であり,程度によっては死に至る場合もあります。長期臥床や骨盤部の手術後に発症することが多いです。エコミークラス症候群も肺塞栓症の一種ですが,入院中においては適切な診療により,かなりの部分が予防可能です。 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|---------|--------|------|--------|------|--------|------|-------|------|-------|------|
| 実績 |  <table border="1"><thead><tr><th>年度</th><th>発生率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>平成28年度</td><td>0.11</td></tr><tr><td>平成29年度</td><td>0.12</td></tr><tr><td>平成30年度</td><td>0.23</td></tr><tr><td>令和元年度</td><td>0.33</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>0.44</td></tr></tbody></table> | 年度 | 発生率 (%) | 平成28年度 | 0.11 | 平成29年度 | 0.12 | 平成30年度 | 0.23 | 令和元年度 | 0.33 | 令和2年度 | 0.44 |
| 年度 | 発生率 (%) | | | | | | | | | | | | |
| 平成28年度 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| 平成29年度 | 0.12 | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度 | 0.23 | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度 | 0.33 | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年度 | 0.44 | | | | | | | | | | | | |
| 定義 | DPCデータを元に算出した,特定の手術を実施した患者に対する「肺血栓塞栓症」の発生割合を算出するものです。 | | | | | | | | | | | | |