

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
1 アーチスト錠 1. 25mg	カルベジロール	5.めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期や増量時）には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないように注意させること。	その他の血圧降下剤
2 アーチスト錠 10mg	カルベジロール	5.めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期や増量時）には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないように注意させること。	その他の血圧降下剤
3 アーテン錠（2mg）	トリヘキシフェニジル塩酸塩	3.ねむけ、眼の調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
4 アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	4.眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。	ビペリデン製剤
5 アタラックスPカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	1.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
6 アタラックスPシロップ 0. 5%	ヒドロキシジンパモ酸塩	1.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
7 アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	イミプラミン系製剤
8 アブストラル舌下錠 100μg	フェンタニルクエン酸塩	6.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の合成麻薬
9 アブストラル舌下錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	6.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の合成麻薬
10 アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	3.失神、意識消失、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。投与にあたっては、これらの副作用が発現する可能性があることを患者等に十分に説明すること。	ピリドンカルボン酸系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
11 アヘンチンキ	アヘン	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	アヘンチンキ及びエキス類製剤
12 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	4.めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。	アマンタジン製剤
13 アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	6.*アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。	その他の中枢神経系用薬
14 アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	6.*アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。	その他の中枢神経系用薬
15 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
16 アレビアチン散10%（100mg/g）	フェニトイン	4.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	ヒダントイン系製剤
17 アレビアチン錠100mg	フェニトイン	4.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	ヒダントイン系製剤
18 アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	モルヒネ系製剤
19 アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	モルヒネ系製剤
20 イーケブラ錠250mg	レベチラセタム	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
21 イーケブラ錠500mg	レベチラセタム	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
22 イーシー・ドパール配合錠	レボドパ\ベンセラジド塩酸塩	5.前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
23 イーフエンバツカル錠50μg	フェンタニルクエン酸塩	6.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の合成麻薬
24 イーフエンバツカル錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	6.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の合成麻薬
25 イミグラン錠50mg	スマトリプタンコハク酸塩	3.片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。	血管収縮剤
26 インヴェガ錠3mg	パリペリドン	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
27 エクセグラン散20%（200mg/g）	ゾニサミド	3.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
28 エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	3.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
29 エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
30 エバミール錠1.0	ロルメタゼパム	本剤の影響により、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
31 エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
32 エピレオプチマル散50%（500mg/g）	エトスクシミド	3.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗てんかん剤
33 エフピーOD錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	2.**めまい、注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
34 エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	エペリゾン塩酸塩	本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。	その他の鎮けい剤
35 オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
36 オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
37 オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
38 オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
39 オキシコンチン錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
40 オキシコンチン錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
41 オキシコンチン錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
42 オキシコンチン錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	3.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
43 オキノーム散0.5%2.5mg包	オキシコドン塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
44 オキノーム散0.5%5mg包	オキシコドン塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
45 オキノーム散1%10mg包	オキシコドン塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
46 オキノーム散2%20mg包	オキシコドン塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他のあへんアルカロイド系麻薬
47 オピセゾールコデイン液	キキョウ流エキス\カンゾウエキス\シャゼンソウエキス\シャクヤクエキス\ジヒドロコデインリン酸塩	2.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の鎮咳去たん剤
48 オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	モルヒネ系製剤
49 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	オロパタジン塩酸塩	1.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。	その他のアレルギー用薬
50 カディアンカプセル30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	モルヒネ系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
51 カバサル錠 1.0mg	カベルゴリン	4.前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧がみられることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業には従事させないよう注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
52 ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	3.*傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
53 クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピソール塩酸塩	6.本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
54 グラマリール錠 25mg	チアプリド塩酸塩	1.眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
55 クロザリル錠 25mg	クロザピン	10.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
56 クロザリル錠 100mg	クロザピン	10.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
57 クロチアゼパム錠 5mg 「トーワ」	クロチアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
58 コデインリン酸塩散 1%「タケダ」（10mg/g）	コデインリン酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	コデイン系製剤（家庭麻薬）
59 コムタン錠 100mg	エンタカポン	3.前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
60 コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	クロルプロマジン製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
61 ギザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	1.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。	その他のアレルギー用薬
62 ギジテンドライシロップ 0.1%	ケチフェンフマル酸塩	3.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。	その他のアレルギー用薬
63 サレドカプセル 50	サリドマイド	5.傾眠、眠気、めまい、徐脈、起立性低血圧が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
64 サレドカプセル 100	サリドマイド	5.傾眠、眠気、めまい、徐脈、起立性低血圧が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
65 シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	5.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
66 ギブレキサザイデイス錠 2.5mg	オランザピン	9.傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には高所での作業あるいは自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
67 ギブレキサ錠 5mg	オランザピン	9.傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には高所での作業あるいは自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
68 シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	6.めまい、ふらつき、低血糖があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の不整脈用剤
69 ギルテックドライシロップ 1.25%	セチリジン塩酸塩	1.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。	その他のアレルギー用薬
70 ギルテック錠 10mg	セチリジン塩酸塩	1.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。	その他のアレルギー用薬

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
71 スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	2.ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の消化性潰瘍用剤
72 セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	3.眠気・めまい等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
73 セパゾン錠1mg	クロキサゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
74 セルシン錠2mg	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
75 セルシン錠5mg	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
76 セレニカR顆粒40%（400mg/g）	バルプロ酸ナトリウム	8.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗てんかん剤
77 ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン塩酸塩	1.眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。	その他の解熱鎮痛消炎剤
78 ゾピクロン錠7.5mg「トーフ」	ゾピクロン	2.本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
79 ゾルピデム酒石酸塩錠5mgDSP	ゾルピデム酒石酸塩	2.本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
80 ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の骨格筋弛緩剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
81 チザニジン錠1mg「テバ」	チザニジン塩酸塩	2.反射運動能力の低下、眠気、めまい及び低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。	その他の鎮けい剤
82 ディアコミットカプセル250mg	スチリピントール	8.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
83 テグレトール細粒50%（500mg/g）	カルバマゼピン	3.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
84 テグレトール錠100mg	カルバマゼピン	3.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
85 テグレトール錠200mg	カルバマゼピン	3.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
86 デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	8.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
87 デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	8.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
88 デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	8.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
89 デプロメール錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩	1.眠気、意識レベルの低下・意識消失等の意識障害が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
90 デュオドーパ配合経腸用液100mL	レボドパ\カルビドパ水和物	6.前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。	その他の抗パーキンソン剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
91 デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	12.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の合成麻薬
92 デュロテップMTパッチ12.6mg	フェンタニル	12.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の合成麻薬
93 テルロン錠0.5mg	テルグリド	1.血圧下降がみられることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
94 ドパストン散98.5%（985mg/g）	レボドパ	4.前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。	レボドパ製剤
95 トピナ錠25mg	トピラマート	6.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗てんかん剤
96 トピナ錠50mg	トピラマート	6.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗てんかん剤
97 トフラニール錠25mg	イミプラミン塩酸塩	6.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	イミプラミン系製剤
98 ドラール錠15mg	クアゼパム	2.本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
99 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
100 トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	3.眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。	その他の解熱鎮痛消炎剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
101 トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	4.眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。	その他の解熱鎮痛消炎剤
102 トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」	トリアゾラム	2.本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
103 トリクロロールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	3.本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
104 トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン塩酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
105 トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン塩酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
106 トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	3.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
107 ニポラジン錠3mg	メキタジン	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作には従事させないよう十分注意すること。	フェノチアジン系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
108 ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	<p><警告> 前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p> <p><重注> 1.本剤を含めたドパミン受容体作動薬の投与により突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されている。突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後に初めて発現した例も報告されている。患者には本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p>	その他の抗パーキンソン剤
109 ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	<p><警告> 前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p> <p><重注> 1.本剤を含めたドパミン受容体作動薬の投与により突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されている。突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後に初めて発現した例も報告されている。患者には本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p>	その他の抗パーキンソン剤
110 ネオシネジンコーワ5%点眼液10mL	フェニレフリン塩酸塩	3.本剤を投与した患者には散瞳が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	散瞳剤
111 ネオドパストン配合錠L100mg	レボドパ\カルビドパ水和物	5.前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
112 ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	2.前兆のない突発的睡眠、睡眠発作、起立性低血圧、傾眠、めまい、意識消失、失神等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作、高所作業等、危険を伴う作業に従事させないように注意すること。	その他の抗パーキンソン剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
113 ノックピン原末	ジスルフィラム	8.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の習慣性中毒用剤
114 ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	フェノチアジン系製剤
115 ノリトレン錠2.5mg	ノルトリプチリン塩酸塩	6.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
116 ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	11.眠気、めまい、ふらつきが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の解熱鎮痛消炎剤
117 ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	11.眠気、めまい、ふらつきが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の解熱鎮痛消炎剤
118 ノルスパンテープ20mg	ブプレノルフィン	11.眠気、めまい、ふらつきが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の解熱鎮痛消炎剤
119 パーロデル錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	1.著しい血圧下降、前兆のない突発的睡眠、傾眠があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には、従事させないように注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
120 バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	6.本剤及び本剤の活性代謝物であるガンシクロビルの投与により痙攣、鎮静、めまい、運動失調、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事させないこと。	抗ウイルス剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
121 ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	<p><警告> 前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p> <p><重注> 1.突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されている。突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後に初めて発現した例も報告されている。患者には本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p>	その他の抗パーキンソン剤
122 ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	<p><警告> 前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p> <p><重注> 1.突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されている。突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後に初めて発現した例も報告されている。患者には本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p>	その他の抗パーキンソン剤
123 ビムパット錠50mg	ラコサミド	2.浮動性めまい、霧視、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗てんかん剤
124 ヒルナミン細粒10%（100mg/g）	レボメプロマジンマレイン酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	フェノチアジン系製剤
125 ヒルナミン錠（25mg）	レボメプロマジンマレイン酸塩	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	フェノチアジン系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
126 ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	2.眠気、めまい、ふらつきが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	他に分類されないその他の代謝性医薬品
127 ピレチア錠（25mg）	プロメタジン塩酸塩	1.眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	フェノチアジン系製剤
128 ファリーダックカプセル 10mg	パノビノスタット乳酸塩	7.本剤投与により、低血圧、起立性低血圧、失神、意識消失があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
129 ファリーダックカプセル 15mg	パノビノスタット乳酸塩	7.本剤投与により、低血圧、起立性低血圧、失神、意識消失があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
130 フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	5.めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
131 ブイフェンド錠 50mg	ポリコナゾール	3.羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。	その他の主としてカビに作用するもの
132 ブイフェンド錠 200mg	ポリコナゾール	3.羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。	その他の主としてカビに作用するもの
133 フェノバル錠 30mg	フェノバルビタール	4.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
134 フェノバルビタール散 10%（100mg/g）	フェノバルビタール	4.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
135 フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	12.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の合成麻薬

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
136 フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	12.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の合成麻薬
137 フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	12.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の合成麻薬
138 ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	眼の調節障害等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	アトロピン系製剤
139 プリミドン細粒99.5%日医工(995mg/g)	プリミドン	4.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	プリミドン系製剤
140 プリミドン錠250mg「日医工」	プリミドン	4.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	プリミドン系製剤
141 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
142 プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	1.本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
143 プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	プロピペリン塩酸塩	眼調節障害、眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように十分に注意すること。	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
144 ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	その他の抗ヒスタミン剤
145 ペリアクチン散1%(10mg/g)	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	その他の抗ヒスタミン剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
146 ベルソムラ錠10mg	スポレキサント	1.本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
147 ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	1.本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
148 ベルソムラ錠20mg	スポレキサント	1.本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
149 ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
150 ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	4.外国臨床試験において、傾眠、錯乱、疲労、意識レベルの低下、めまいが報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
151 ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	4.外国臨床試験において、傾眠、錯乱、疲労、意識レベルの低下、めまいが報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
152 ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。	その他の抗ヒスタミン剤
153 ホリゾン散1%（10mg/g）	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
154 マイスタン細粒1%（10mg/g）	クロバザム	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
155 マイスタン錠10mg	クロバザム	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
156 ミオカーム内服液 33.3%	ピラセタム	5.眠気、抑うつ、運動過剰等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
157 ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。	テトラサイクリン系抗生物質製剤
158 メイラックス錠 1mg	ロフラゼプ酸エチル	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
159 メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	3.頭がボーとする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の不整脈用剤
160 メサペイン錠 5mg	メサドン塩酸塩	8.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の合成麻薬
161 メジコン錠 15mg	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	デキストロメトルフアン製剤
162 メトクロプラミド錠 5mg 「テバ」	メトクロプラミド	2.眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	他に分類されない消化器官用薬
163 メネシット配合錠 100mg	レボドパ\カルビドパ水和物	5.前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。	その他の抗パーキンソン剤
164 メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	2.通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が低下することがある。また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
165 モルヒネ塩酸塩原末	モルヒネ塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	モルヒネ系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
166 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	モルヒネ系製剤
167 ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	2.本剤投与中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
168 ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
169 ラミクタール錠100mg	ラモトリギン	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
170 ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
171 ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
172 リーマス錠200mg	炭酸リチウム	1.めまい、ねむけ等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
173 リオレサル錠5mg	バクロフェン	2.眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。	その他の鎮けい剤
174 リスパダール錠1mg	リスペリドン	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
175 リスパダール錠3mg	リスペリドン	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
176 リスペリドン内用液（分包）1mg/mL「ヨシトミ」	リスペリドン	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
177 リバスタッチパッチ4. 5mg	リバステグミン	4.アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の中枢神経系用薬
178 リバスタッチパッチ9mg	リバステグミン	4.アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の中枢神経系用薬
179 リバスタッチパッチ18mg	リバステグミン	4.アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の中枢神経系用薬
180 リフレックス錠15mg	ミルタザピン	5.眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
181 リボトリール細粒0. 1%（1mg/g）	クロナゼパム	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
182 リボトリール錠0. 5mg	クロナゼパム	7.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の抗てんかん剤
183 リリカOD錠25mg	プレガバリン	1.本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること。	その他の中枢神経系用薬
184 リリカOD錠75mg	プレガバリン	1.本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること。	その他の中枢神経系用薬

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
185 リルテック錠 50mg	リルゾール	6.本剤の投与中に、めまい又は眠気が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
186 リントン細粒 1% (10mg/g)	ハロペリドール	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
187 リントン錠(0.75mg)	ハロペリドール	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
188 ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	2.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
189 ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	6.めまい、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の精神神経用剤
190 ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	2.本剤の影響が翌朝以降に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
191 レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
192 レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	<p><警告> 前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。</p> <p><重注> 1.突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されていることから、患者には突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。なお、海外において突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後初めて発現した例も報告されている。</p>	その他の抗パーキンソン剤
193 レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。	ジフェンヒドラミン系製剤
194 レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	5.海外臨床試験において、疲労、めまい、傾眠、霧視、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
195 レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	2.眠気、めまい、ふらつき、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の解熱鎮痛消炎剤
196 レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン塩酸塩	2.眠気、めまい、ふらつき、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の解熱鎮痛消炎剤
197 レミッチカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	2.眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬
198 ロートエキス散10%（100mg/g）	ロートエキス	視調節障害、散瞳、羞明、めまい等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の鎮けい剤
199 ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	1.本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の中枢神経系用薬

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
200 ロナセン錠4mg	ブロナンセリン	1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の精神神経用剤
201 ロペミン小児用細粒0.05%（0.5mg/g）	ロペラミド塩酸塩	4.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の止しゃ剤、整腸剤
202 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	3.眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	その他の止しゃ剤、整腸剤
203 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	ベンゾジアゼピン系製剤
204 ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	3.眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。	その他の解熱鎮痛消炎剤
205 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	リルマザホン塩酸塩水和物	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
206 臭化カリウム	臭化カリウム	1.(1)眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本薬投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意する。	ブロム塩製剤
207 硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	[経口用剤として用いる場合]視調節障害、散瞳等をおこすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。 [眼科用剤として用いる場合]散瞳または視調節麻痺がおこるので、本剤投与中の患者には、散瞳または視調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。	アトロピン系製剤
208 MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	モルヒネ系製剤
209 MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	2.眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	モルヒネ系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を控える必要のある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
210 MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物	2.眠気，眩暈が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	モルヒネ系製剤
211 P L 配合顆粒 1 g 包	サリチルアミド\アセトアミノフェン \無水カフェイン\プロメタジンメチ レンジサリチル酸塩	2.眠気を催すことがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	総合感冒剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を状況によって控える必要がある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
1 アロマシン錠25mg	エキセメスタン	4.本剤の使用による嗜眠、傾眠、無力(症)及びめまいが報告されており、このような症状がある場合、機械操作や自動車の運転はさせないよう十分注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
2 イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	6.*眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。	その他の精神神経用剤
3 キサラタン点眼液0.005%2.5mL	ラタプロスト	4.本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。	その他の眼科用剤
4 サイプレジン1%点眼液10mL	シクロペントラート塩酸塩	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	散瞳剤
5 サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	7.眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。	その他の精神神経用剤
6 サムスカ錠15mg	トルバプタン	I-(8)めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。 III. 常染色体優性多発性嚢胞腎の場合	その他の利尿剤
7 サンピロ点眼液2%5mL	ピロカルピン塩酸塩	縮瞳(暗黒感)又は調節痙攣が起こるので、本剤投与中の患者には、縮瞳(暗黒感)又は調節痙攣が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	縮瞳剤
8 ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	9.本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	フェニル酢酸系製剤
9 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	10.本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	フェニル酢酸系製剤
10 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	10.本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	フェニル酢酸系製剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を状況によって控える必要がある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
11 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	10.本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。	フェニル酢酸系製剤
12 タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	9.めまい、霧視・視力低下等の視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
13 タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	9.めまい、霧視・視力低下等の視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	その他の抗悪性腫瘍用剤
14 タプロス点眼液0.0015%2.5mL	タフルプロスト	4.本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。	その他の眼科用剤
15 トラバタンズ点眼液0.004%2.5mL	トラボプロスト	4.本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。	その他の眼科用剤
16 トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	5.* * 眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。	その他の精神神経用剤
17 ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	5.本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	冠血管拡張剤
18 ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	6.本剤使用開始時には他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は使用を中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	冠血管拡張剤
19 パラシクロビル錠500mg「EE」	パラシクロビル塩酸塩	11.*意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないように注意すること。	抗ウイルス剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を状況によって控える必要がある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
20 バルトレックス顆粒50%（500mg/g）バラ	バラシクロビル塩酸塩	11.*意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。	抗ウイルス剤
21 ビクロック錠200mg	アシクロビル	8.意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。	抗ウイルス剤
22 ミオコールスプレー0.3mg/1噴霧	ニトログリセリン	3.本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	冠血管拡張剤
23 ミドリンM点眼液0.4%5mL	トロピカミド	2.散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	散瞳剤
24 ミドリンP点眼液10mL	トロピカミド\フェニレフリン塩酸塩	<重注> 2.散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。 <取注> 2.この検査のあと、半日位は自動車等の運転や危険な作業はさけて下さい。	その他の眼科用剤
25 メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩	2.本剤の投与により、めまい、平衡感覚障害、精神神経障害が発現することがあるので、投与後少なくとも4週間は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、ジェットコースター等の動きの激しい乗物への乗車を避けさせること。	その他の抗寄生虫剤
26 リュウアト1%眼軟膏3.5g	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。	散瞳剤
27 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	5.本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意す	冠血管拡張剤

自動車運転・機械の操作・高所作業等、危険を伴う作業を状況によって控える必要がある医薬品（院内取扱い医薬品抜粋）

2017.9

医薬品名	一般名	添文記載事項	薬効
28 日点アトロピン点眼液 1% 5 mL	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	散瞳剤
29 S G 配合顆粒 1 g 包	イソプロピルアンチピリン\アリルイソプロピルアセチル尿素\アセアミノフェン\無水カフェイン	4.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作等、機敏な動作を必要とする仕事になるべく従事させないように注意すること。	その他の解熱鎮痛消炎剤