

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
ハイアート	1 %ディブリバン注ーキット	プロポフォール	全身麻酔・鎮静用剤
採用	1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
採用	A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	口腔・咽頭疾患含嗽剤
採用	E O B・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	線状型MR I 用肝臓造影剤
採用	HMG注用1 5 0 単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤
ハイアート	K C L 注2 0 m E q キット「テルモ」	塩化カリウム	補正用電解質液
採用	K N 3 号輸液	維持液	維持液
採用	L H－RH注0. 1 m g 「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	L H 分泌ホルモン剤
採用	L－ケフレックス顆粒	セファレキシン	持続性セフェム系抗生物質
採用	MSコンチン錠1 0 m g	モルヒネ硫酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
採用	MSコンチン錠3 0 m g	モルヒネ硫酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
採用	MS温シップ「タイハウ」	パップ剤	鎮痛・消炎パップ剤
採用	P A・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素	洗眼殺菌剤
採用	P L 配合顆粒	非ピリン系感冒剤	総合感冒剤
採用	S P トローチ0. 2 5 m g 「明治」	デカリニウム塩化物	口腔用剤
採用	T R H注0. 5 m g 「ニプロ」	プロチレリン	T S H・プロラクチン分泌ホルモン剤
採用	u F S H注用1 5 0 単位「あすか」	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	卵胞成熟ホルモン（F S H）製剤
採用	u F S H注用7 5 単位「あすか」	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	卵胞成熟ホルモン（F S H）製剤
採用	アーチスト錠1. 2 5 m g	カルベジロール	慢性心不全治療剤
採用	アーチスト錠1 0 m g	カルベジロール	持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
採用	アーテン錠（2 m g）	トリヘキシフェニジル塩酸塩	パーキンソン症候群治療剤
採用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
採用	アービタックス注射液1 0 0 m g	セツキシマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	アーリーダ錠6 0 m g	アパルタミド	前立腺癌治療剤
採用	アイオピジンUD点眼液1 %	アプラクロニジン塩酸塩	レーザー術後眼圧上昇防止剤
採用	アイソボリン点滴静注用2 5 m g	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
採用	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	長時間作用型A R B／持続性C a 拮抗薬配合剤
採用	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・布林ゾラミド	緑内障・高眼圧症治療剤
試用	アイリーア8 m g 硝子体内注射液1 1 4. 3 m g／m L	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	眼科用V E G F 阻害剤
採用	アイリーア硝子体内注射用キット4 0 m g／m L	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	眼科用V E G F 阻害剤
採用	アキネトン錠1 m g	ビペリデン塩酸塩	抗パーキンソン剤
採用	アキネトン注射液5 m g	乳酸ビペリデン	抗パーキンソン剤
採用	アクアチムクリーム1 %	ナジフロキサシン	新キノロン系外用抗菌剤
採用	アクアチムローション1 %	ナジフロキサシン	新キノロン系外用抗菌剤
採用	アクテムラ点滴静注用4 0 0 m g	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトI L－6レセプターモノクローナル抗体
採用	アクテムラ点滴静注用8 0 m g	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトI L－6レセプターモノクローナル抗体
採用	アクトシン軟膏3 %	ブクラデシンナトリウム	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
採用	アクトネル錠7 5 m g	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
採用	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	細菌ワクチン類
採用	アクブラ静注用1 0 0 m g	ネダプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	アクブラ静注用1 0 m g	ネダプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	アクブラ静注用5 0 m g	ネダプラチン	抗悪性腫瘍剤
ハイアート	アクラシノン注射用2 0 m g	アクラルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
採用	アコアラン静注用6 0 0	アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）	血液凝固阻止剤
採用	アザクタム注射用1 g	アズトレオナム	モノバクタム系抗生物質
採用	アサコール錠4 0 0 m g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
採用	アザルフィジンEN錠5 0 0 m g	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤
採用	アシクロビル点滴静注液2 5 0 m g 「トローワ」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
採用	アジルバ錠2 0 m g	アジルサルタン	持続性A T 1 レセプターブロッカー

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	アジレクト錠0. 5 m g	ラサギリンメシル酸塩	パーキンソン病治療剤
採用	アスタット軟膏1 %	ラノコナゾール	抗真菌剤
採用	アストミン錠1 0 m g	ジメモルファンリン酸塩	鎮咳剤
採用	アスパラカリウム錠3 0 0 m g	L－アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
ハイアート	アスパラギン酸カリウム注1 0 m E qキット 「テルモ」	L－アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
採用	アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
採用	アスベリンシロップ0. 5 %	チペピジンヒベンズ酸塩	鎮咳剤
採用	アスベリン散1 0 %	チペピジンヒベンズ酸塩	鎮咳剤
採用	アセトアミノフェン「J G」原末	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
採用	アセトアミノフェン錠2 0 0 m g「マルイ シ」	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
採用	アセリオ静注液1 0 0 0 m g バッグ	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
採用	アゼルニジピン錠1 6 m g「J G」	アゼルニジピン	持続性C a拮抗剤
採用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
採用	アタラックス－Pカプセル2 5 m g	ヒドロキシジンパモ酸塩	抗アレルギー性緩和精神的安定剤
採用	アタラックス－Pシロップ0. 5 %	ヒドロキシジンパモ酸塩	抗アレルギー性緩和精神的安定剤
採用	アタラックス－P注射液（2 5 m g／m l）	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー性緩和精神的安定剤
仮採用	アダリムマブB S皮下注4 0 m g ペン0. 8 m L「第一三共」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトT N F αモノクローナル抗体製 剤
採用	アデノシン負荷用静注6 0 m g シリンジ「F R I」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
採用	アデホス－Lコーワ注2 0 m g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活剤
採用	アデホスコーワ腸溶錠6 0	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活剤
採用	アデホスコーワ顆粒1 0 %	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活・抗めまい剤
採用	アデムパス錠0. 5 m g	リオシグアト	可溶性グアニル酸シクラーゼ（s G C）刺激 剤
採用	アテレック錠1 0	シルニジピン	持続性C a拮抗降圧剤
採用	アドシルカ錠2 0 m g	タダラフィル	ホスホジエステラーゼ5阻害剤
採用	アドセトリス点滴静注用5 0 m g	ブレンツキシマブ ベドチン（遺伝子組換 え）	抗悪性腫瘍剤
採用	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	消化管用吸着剤
採用	アトニン－O注5単位	オキシトシン	脳下垂体後葉ホルモンの剤
採用	アドフィードパップ4 0 m g	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
採用	アトルバスタチン錠1 0 m g「D S E P」	アトルバスタチンカルシウム水和物	H M G－C o A還元酵素阻害剤
採用	アドレナリン注0. 1 %シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
採用	アトロピン注0. 0 5 %シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
採用	アトロピン硫酸塩注0. 5 m g「フソー」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
採用	アトワゴリバース静注シリンジ6 m L	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫 酸塩水和物	副交感神経興奮剤
採用	アナフラニール錠2 5 m g	クロミプラミン塩酸塩	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治 療剤
採用	アナペイン注7. 5 m g／m L	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
採用	アネメトロ点滴静注液5 0 0 m g	メトロニダゾール	嫌気性菌感染症治療剤
ハイアート	アネレム静注用5 0 m g	レミマゾラムベシル酸塩	全身麻酔剤
採用	アノーロエリプタ3 0吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールト リフェニル酢酸塩	C O P D治療配合剤
採用	アバスチン点滴静注用1 0 0 m g／4 m L	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	アバスチン点滴静注用4 0 0 m g／1 6 m L	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	アフィニートル錠5 m g	エベロリムス	抗悪性腫瘍剤
採用	アブストラル舌下錠1 0 0 μ g	フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤
採用	アフタッチ口腔用貼付剤2 5 μ g	トリアムシノロンアセトニド	付着性アフタ性口内炎治療剤
採用	アブラキサン点滴静注用1 0 0 m g	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	抗悪性腫瘍剤
採用	アプレピタントカプセル1 2 5 m g「N K」	アプレピタント	選択的N K 1受容体拮抗型制吐剤
採用	アプレピタントカプセル8 0 m g「N K」	アプレピタント	選択的N K 1受容体拮抗型制吐剤
採用	アベロックス錠4 0 0 m g	モキシフロキサシン塩酸塩	ニューキノロン系経口抗菌剤
採用	アヘンチンキ	アヘンチンキ	鎮痛・止瀉剤
採用	アボルブカプセル0. 5 m g	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗 A 型インフルエンザウイルス剤
採用	アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0 m g 「T E」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「T E」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
採用	アミカシン硫酸塩注射液 2 0 0 m g 「明治」	アミカシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
採用	アミティーザカプセル 2 4 μ g	ルビプロストン	クロライドチャネルアクチベーター
採用	アミノレバン E N 配合散	肝不全用成分栄養剤	肝不全用栄養剤
採用	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
採用	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
採用	アムヴトラ皮下注 2 5 m g シリンジ	ブトリシランナトリウム	トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤
採用	アムビゾーム点滴静注用 5 0 m g	アムホテリシン B	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤
採用	アムロジピン O D 錠 5 m g 「サワイ」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性 C a 拮抗剤
採用	アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤
採用	アメナリーフ錠 2 0 0 m g	アメナメビル	抗ヘルペスウイルス剤
採用	アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「トーワ」	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤
採用	アラノンジー静注用 2 5 0 m g	ネララビン	抗悪性腫瘍剤
採用	アラミスト点鼻液 2 7. 5 μ g 5 6 噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
採用	アリセプト D 錠 3 m g	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤
採用	アリセプト D 錠 5 m g	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤
採用	アリドネパッチ 2 7. 5 m g	ドネペジル	アルツハイマー型認知症治療剤
採用	アリナミン F 5 0 注	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミン B 1 誘導体
採用	アリナミン注射液 1 0 m g	プロスルチアミン	ビタミン B 1 誘導体製剤
採用	アリミデックス錠 1 m g	アナストロゾール	閉経後乳癌治療剤
採用	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液 1 0 % 「メタル」	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	殺菌消毒剤
採用	アルケラン錠 2 m g	メルファラン	抗多発性骨髄腫剤
採用	アルケラン静注用 5 0 m g	メルファラン	造血幹細胞移植前処置剤
採用	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	関節手術用灌流・洗浄液
採用	アルチバ静注用 2 m g	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
採用	アルツディスポ関節注 2 5 m g	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
採用	アルドメット錠 2 5 0	メチルドバ水和物	血圧降下剤
採用	アルト原末	アルギン酸ナトリウム	局所止血剤
採用	アルファカルシドールカプセル 0. 2 5 μ g 「トーワ」	アルファカルシドール	活性型ビタミン D 3 製剤
採用	アルファロール内用液 0. 5 μ g ／m L	アルファカルシドール	C a ・骨代謝改善剤
採用	アルプラゾラム錠 0. 4 m g 「サワイ」	アルプラゾラム	マイナートランキライザー
採用	アルプロスタジル注 5 μ g 「サワイ」	アルプロスタジル	P G E 1 製剤
採用	アルロイド G 内用液 5 %	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤
採用	アレックスビー筋注用	組換え R S ウイルスワクチン	
採用	アレビアチン散 1 0 %	フェニトイン	抗てんかん剤
採用	アレビアチン錠 1 0 0 m g	フェニトイン	抗てんかん剤
採用	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	選択的 N K 1 受容体拮抗型制吐剤
採用	アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「D S P」	アロチノロール塩酸塩	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤
採用	アロプリノール錠 1 0 0 m g 「ニプロ」	アロプリノール	高尿酸血症治療剤
採用	アンサー皮下注 2 0 μ g	結核菌熱水抽出物	放射線療法による白血球減少抑制剤
採用	アンチレクス静注 1 0 m g	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
採用	アンテベート軟膏 0. 0 5 %	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
採用	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤
採用	アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	気道潤滑去たん剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
採用	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
採用	イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	抗てんかん剤
採用	イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
採用	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	抗パーキンソン剤
採用	イオパミロン注300	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
採用	イオパミロン注300	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
採用	イオパミロン注370	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
採用	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
採用	イオメロン300注100mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
採用	イオメロン350注100mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
採用	イオメロン350注20mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
採用	イオメロン350注シリンジ100mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
採用	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
採用	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
採用	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
採用	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
採用	イスコチン錠100mg	isoniazid	結核化学療法剤
採用	イソジンシュガーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
ハイアート	イソゾール注射用0.5g	チアミールナトリウム	全身麻酔剤
採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤
採用	イソビスト注300	イオトロラン	非イオン性子宮卵管・関節造影剤
採用	イソプロパノール「タイセイ」	イソプロパノール	殺菌消毒剤
ハイアート	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
採用	イドメシンコーワゲル1%	インドメタシン	外皮用非ステロイド性抗炎症・鎮痛剤
採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	抗真菌剤
採用	イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール	抗真菌剤
採用	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
採用	イヌリード注	インスリン	腎機能検査用薬
採用	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
採用	イノバン注100mg	ドパミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
採用	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
採用	イノレット30R注	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
採用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
採用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トローワ」	イフェンプロジル酒石酸塩	鎮量剤
採用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤
採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻害剤
採用	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	イムネース注35	テセロイキン（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターロイキン-2製剤
採用	イムノブラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用（日本株）	抗悪性腫瘍剤
採用	イムラン錠50mg	アザチオプリン	免疫抑制剤
採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トローワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トローワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群治療剤
採用	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	イルベサルタン	長時間作用型ARB
採用	インヴェガ錠3mg	パリペリドン	抗精神病剤
採用	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤
採用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬
採用	インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
仮採用	インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
採用	インターール吸入液１％	クロモグリク酸ナトリウム	喘息治療剤
採用	インダシン静注用１ｍｇ	インドメタシンナトリウム水和物	未熟児動脈管開存症治療剤
採用	インデラル錠１０ｍｇ	プロプラノロール塩酸塩	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
採用	インデラル注射液２ｍｇ	プロプラノロール塩酸塩	β遮断性不整脈・狭心症治療剤
採用	イントラリポス輸液２０％	ダイズ油	脂肪乳剤
仮採用	インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤
採用	インフルエンザＨＡワクチン「生研」	インフルエンザＨＡワクチン	
採用	ヴィーンＤ輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	細胞外液補充液
採用	ヴォトリエント錠２００ｍｇ	パゾパニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
試用	ウゴービ皮下注０．２５ｍｇＳＤ	セマグルチド（遺伝子組換え）	肥満症治療剤
採用	ウトロゲスタン腔用カプセル２００ｍｇ	プロゲステロン	天然型黄体ホルモン製剤
採用	ウプトラビ錠０．２ｍｇ	セレキシパグ	選択的ＰＧＩ２受容体作動薬
採用	ウブレチド錠５ｍｇ	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
採用	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
採用	ウリアデック錠４０ｍｇ	トピロキソスタット	高尿酸血症治療剤
採用	ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤
採用	ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤
採用	ウルソ顆粒５％	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤
採用	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
採用	ウログラフィン注６０％	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	直接膵管胆道・唾液腺造影剤
採用	ウロナーゼ静注用６万単位	ウロキナーゼ	線維素溶解酵素剤
採用	ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％	Ｄ－ソルビトール	泌尿器科用灌流液
採用	ウロミテキサン注４００ｍｇ	メスナ	イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤
採用	エカード配合錠ＨＤ	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤
採用	エキザルベ	混合死菌製剤	皮膚疾患治療剤
ハイアート	エクザール注射用１０ｍｇ	ビンブラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	エクサシン注射液２００	イセパマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
採用	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	エクセグラン散２０％	ゾニサミド	抗てんかん剤
採用	エクセグラン錠１００ｍｇ	ゾニサミド	抗てんかん剤
採用	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
採用	エコ消エタ消毒液	エタノール	殺菌消毒剤
採用	エサンブトール錠２５０ｍｇ	エタンブトール塩酸塩	エタンブトール製剤
採用	エスクレ坐剤「２５０」	抱水クロラル	催眠鎮静剤
採用	エスクレ注腸用キット「５００」	抱水クロラル	催眠鎮静剤
採用	エスサイド消毒液６％	過酢酸	
採用	エスゾピクロン錠１ｍｇ「トーワ」	エスゾピクロン	不眠症治療剤
採用	エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	前立腺癌治療剤
採用	エスポー皮下用２４０００シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	ヒトエリスロポエチン製剤
ハイアート	エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ	ロクロニウム臭化物	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
採用	エスワンタイハウ配合ＯＤ錠Ｔ２０	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
採用	エスワンタイハウ配合ＯＤ錠Ｔ２５	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
採用	エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター
採用	エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」	エチゾラム	精神安定剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	エディロール錠0.75μg	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤
採用	エトキシスクレロール1%注射液	ポリドカノール	食道静脈瘤硬化剤
採用	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド	抗悪性腫瘍剤
採用	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	グレリン様作用薬
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トロー」	エナラプリルマレイン酸塩	持続性ACE阻害剤
採用	エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	男性ホルモン剤
採用	エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
採用	エパデールS900	イコサペント酸エチル	EPA製剤
採用	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	エパルレスタット	アルドース還元酵素阻害剤
採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
採用	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	アリピプラゾール水和物	持続性抗精神病剤
採用	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	抗精神病剤
ハイアート	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
ハイアート	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
採用	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤
採用	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤
採用	エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ベルパタスビル	抗ウイルス剤
採用	エブランチルカプセル30mg	ウラピジル	排尿障害改善・降圧剤
採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	エベリゾン塩酸塩	筋緊張・循環改善剤
採用	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	腎性貧血治療薬
採用	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチン カップ（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
採用	エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）	生理食塩液	生理食塩液
採用	エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	エポプロステノールナトリウム	PGI2製剤
採用	エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	局所麻酔剤
採用	エリキューズ錠2.5mg	アピキサバン	経口FXa阻害剤
採用	エリキューズ錠5mg	アピキサバン	経口FXa阻害剤
採用	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	マクロライド系抗生物質
採用	エリスロシン錠100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	マクロライド系抗生物質
採用	エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤
採用	エルシトニン注40単位	エルカトニン	合成カルシトニン誘導体制剤
採用	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
採用	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
採用	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
採用	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
採用	エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	エルプラット点滴静注液200mg	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カロリー輸液用微量元素製剤
採用	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	成分栄養剤
採用	エンシュア・H	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
採用	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤
採用	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤
採用	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
採用	オイラックスクリーム10%	クロタミトン	鎮痒剤
採用	オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	複合抗生物質
採用	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	歯科用局所麻酔剤
採用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	歯科用局所麻酔剤
採用	オキサロール注5μg	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
採用	オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	角化症治療剤
採用	オキシグルタチオン眼灌流液0.0184% キット「センジュ」	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
採用	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
採用	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
採用	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
採用	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	オキシテトラサイクリン塩酸塩	歯科用抗生物質製剤
採用	オキシドール「東海」	オキシドール	殺菌消毒剤
採用	オキナゾール腔錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	抗真菌剤
採用	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
採用	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
採用	オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
採用	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
採用	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サ ンド」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
採用	オザグレルNa点滴静注80mg/100m Lバッグ「IP」	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
採用	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
試用	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
採用	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	
採用	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	オノアクト点滴静注用150mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
採用	オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	副交感神経興奮剤
採用	オビドレル皮下注シリンジ250μg	コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝子組 換え）	遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製 剤
採用	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	抗線維化剤
採用	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤
採用	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	オプスミット錠10mg	マシテンタン	エンドセリン受容体拮抗薬
採用	オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
採用	オプチレイ240注シリンジ100mL	イオベルソール	非イオン性造影剤
採用	オプチレイ320注シリンジ100mL	イオベルソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク300注100mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク300注シリンジ110mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク300注シリンジ50mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク350注20mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オムニパーク350注シリンジ70mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
採用	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
採用	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリーケー タ25mL	オラネキシジングルコン酸塩	
採用	オリブ油＊（丸石）	オリブ油	軟膏基剤
採用	オルケディア錠1mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
採用	オルセノン軟膏0.25%	トレチノイン トコフェリル	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	オルダミン注射用1 g	モノエタノールアミノレイン酸塩	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤
採用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	吸入ステロイド喘息治療剤
採用	オルミエント錠4 mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
採用	オルメサルタンOD錠20 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT1レセプターブロッカー
採用	オレンシア点滴静注用250 mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
採用	オロパタジン塩酸塩錠5 mg「サワイ」	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
採用	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
ハイアート	オンコビン注射用1 mg	ビンクリスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	オndanセトロン注4 mgシリンジ「マルイシ」	オndanセトロン塩酸塩水和物	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
採用	オンプレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	長時間作用性吸入気管支拡張剤
採用	オンボー点滴静注300 mg	ミリキズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
採用	オンボー皮下注100 mgオートインジェクター	ミリキズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
採用	カーボスター透析剤・L	人工透析液	人工腎臓用透析液
採用	カーボスター透析剤・L	人工透析液	人工腎臓用透析液
採用	カイプロリス点滴静注用10 mg	カルフィルゾミブ	抗悪性腫瘍剤
採用	カイプロリス点滴静注用40 mg	カルフィルゾミブ	抗悪性腫瘍剤
採用	ガザイバ点滴静注1000 mg	オビスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ガスコン錠40 mg	ジメチコン	消化管内ガス駆除剤
採用	ガスター注射液10 mg	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
採用	ガスター注射液20 mg	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	水溶性消化管造影剤
採用	ガスマチン錠5 mg	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤
採用	ガスロンN・OD錠2 mg	イルソグラジンマレイン酸塩	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤
採用	カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩	高血圧症治療剤
採用	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤
採用	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
採用	カドサイラ点滴静注用100 mg	トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体
採用	カドサイラ点滴静注用160 mg	トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体
試用	ガドピスト静注1.0 mol/Lシリンジ10 mL	ガドブトロール	環状型非イオン性MRI用造影剤
採用	ガドピスト静注1.0 mol/Lシリンジ5 mL	ガドブトロール	環状型非イオン性MRI用造影剤
採用	ガドピスト静注1.0 mol/Lシリンジ7.5 mL	ガドブトロール	環状型非イオン性MRI用造影剤
採用	カナグル錠100 mg	カナグリフロジン水和物	SGLT2阻害剤
採用	カナマイシンカプセル250 mg「明治」	カナマイシンー硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
採用	ガニレスト皮下注0.25 mgシリンジ	ガニレリクス酢酸塩	GnRHアンタゴニスト製剤
採用	カバサル錠1.0 mg	カベルゴリン	ドパミン作動薬
採用	ガバペン錠200 mg	ガバペンチン	抗てんかん剤
採用	カプトリル錠25 mg	カプトプリル	レニン・アンジオテンシン系降圧剤
採用	カボメティクス錠20 mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	血清カリウム抑制剤
ハイアート	カルセド注射用20 mg	アムルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍性抗生物質
ハイアート	カルセド注射用50 mg	アムルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍性抗生物質
採用	カルチコール注射液8.5%10 mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
採用	カルデナリンOD錠2 mg	ドキサゾシンメシル酸塩	血圧降下剤
採用	カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ	循環障害改善剤
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30 mg「YD」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na静注50 mg「フソー」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	止血・血管強化剤
採用	カルボカインアンプル注1%	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
採用	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	L-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	L－カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤
採用	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	L－カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤
採用	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
採用	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩	キャンディン系抗真菌剤
採用	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン酢酸塩	キャンディン系抗真菌剤
採用	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	キシラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
採用	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
採用	キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
採用	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	表面麻酔剤
採用	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
採用	キシロカイン注ポリアンブ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
採用	キシロカイン注ポリアンブ2%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
採用	キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤
仮採用	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル	ヒト体細胞加工製品
採用	キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤	アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩配合剤
採用	キュービシン静注用350mg	ダブトマイシン	環状リポペプチド系抗生物質製剤
採用	キロサイドN注1g	シタラビン	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤
採用	キロサイド注200mg	シタラビン	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
採用	キロサイド注20mg	シタラビン	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
採用	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	キンダリー透析剤AF2号	人工透析液	人工腎臓用透析液
採用	キンダリー透析剤AF5号	人工透析液	人工腎臓用透析液
採用	クアトロバック皮下注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン	
採用	クイントバック水性懸濁注射用	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	
採用	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤
採用	クエチアピン細粒50%「アメル」	クエチアピنفマル酸塩	抗精神病剤
採用	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピنفマル酸塩	抗精神病剤
採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤
採用	グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
採用	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
採用	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
採用	グラセプターカプセル5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
採用	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤
採用	グラニセトロン静注液1mg「明治」	グラニセトロン塩酸塩	5－HT3受容体拮抗型制吐剤
採用	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	5－HT3受容体拮抗型制吐剤
採用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	5－HT3受容体拮抗型制吐剤
採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	β－ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤
採用	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤
採用	クラフォラン注射用1g	セフォタキシムナトリウム	セフェム系抗生物質
採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
採用	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	グランシリンジ 1 5 0	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G－C S F 製剤
採用	グランシリンジ 7 5	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G－C S F 製剤
採用	グランシリンジ M 3 0 0	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G－C S F 製剤
採用	クリアクター 静注用 4 0 万	モンテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤
採用	グリセリン「東豊」	グリセリン	調剤用基剤
採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤
採用	グリセリン B C 液「ヨシダ」	グリセリン	
採用	グリセリン浣腸液 5 0 %「ケンエー」	グリセリン	便秘治療剤
採用	グリセリン浣腸液 5 0 %「ケンエー」	グリセリン	便秘治療剤
採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・D L－メチオニン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
採用	グリベック錠 1 0 0 m g	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	グリメピリド錠 1 m g「トーワ」	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 6 0 0 m g「NPJ」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
採用	グルカゴン G ノボ注射用 1 m g	グルカゴン（遺伝子組換え）	グルカゴン（遺伝子組換え）製剤
採用	グルトパ注 6 0 0 万	アルテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（r t－P A 製剤）
採用	グルファスト O D 錠 1 0 m g	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬
採用	グレースビット錠 5 0 m g	シタフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
採用	クレキサン皮下注キット 2 0 0 0 I U	エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
採用	クレナフィン爪外用液 1 0 %	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤
採用	クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	球形吸着炭	慢性腎不全用剤
採用	クロザリル錠 2 5 m g	クロザピン	治療抵抗性統合失調症治療剤
採用	クロチアゼパム錠 5 m g「トーワ」	クロチアゼパム	心身安定剤
採用	クロピドグレル錠 7 5 m g「サワイ」	クロピドグレル硫酸塩	抗血小板剤
採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1 %「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩	
採用	ケアラム錠 2 5 m g	イグラチモド	抗リウマチ剤
採用	ケイツー N 静注 1 0 m g	メナテトレノン	止血機構賦活ビタミン剤
採用	ケイツーシロップ 0. 2 %	メナテトレノン	ビタミン K 2 剤
採用	ゲーベンクリーム 1 %	スルファジアジン銀	外用感染治療剤
採用	ケタラール 静注用 5 0 m g	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
採用	ケトプロフェンテープ S 2 0 m g「テイコク」	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
採用	ケナコルト－ A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g／1 m L	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	ケフラールカプセル 2 5 0 m g	セファクロル	セフェム系抗生物質
採用	ゲムシタビン点滴静注用 1 g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
採用	ゲムシタビン点滴静注用 2 0 0 m g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
採用	ケレンディア錠 1 0 m g	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 6 0 m g「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0. 1 %「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
採用	コアテック注 5 m g	オルプリノン塩酸塩水和物	急性心不全治療剤
採用	コアベータ 静注用 1 2. 5 m g	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型 β 1 選択的遮断剤
採用	コートリル錠 1 0 m g	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤
採用	コートロシン Z 筋注 0. 5 m g	テトラコサクチド酢酸塩	持続性合成 A C T H 製剤
採用	コートロシン注射用 0. 2 5 m g	テトラコサクチド酢酸塩	合成 A C T H 製剤
採用	コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾロン	血管収縮剤
ハイアート	コスメゲン 静注用 0. 5 m g	アクチノマイシン D	抗腫瘍性抗生物質
採用	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
採用	コデインリン酸塩散 1 %「フソー」	コデインリン酸塩水和物	鎮咳剤
採用	ゴナールエフ皮下注ペン 3 0 0	ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン（F S H）製剤
採用	ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ゴナックス皮下注用 2 4 0 m g	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
採用	ゴナックス皮下注用 8 0 m g	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
採用	ゴナトロピン注用 5 0 0 0 単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤
採用	コバシル錠 4 m g	ペリンドプリルエルブミン	持続性組織 A C E 阻害剤
採用	コムタン錠 1 0 0 m g	エンタカポン	末梢 C O M T 阻害剤
採用	コララン錠 2 . 5 m g	イバブラジン塩酸塩	H C N チャネル遮断薬
採用	コルヒチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤
採用	コレクチム軟膏 0 . 5 %	デルゴシチニブ	外用ヤヌスキナーゼ（J A K）阻害剤
採用	コントミン糖衣錠 2 5 m g	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
採用	コンファクト F 静注用 1 0 0 0 単位	乾燥濃縮人血液凝固第 V I I I 因子	血漿分画製剤
採用	ザーネ軟膏 0 . 5 %	ビタミン A 油	外用ビタミン A 剤
採用	サーバリックス	組換え沈降 2 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	
採用	サーファクテン気管注入用 1 2 0 m g	肺サーファクタント	新生児呼吸窮迫症候群治療剤
採用	ザイザル錠 5 m g	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択 H 1 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
採用	ザイティガ錠 2 5 0 m g	アビラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤
採用	サイトテック錠 2 0 0	ミソプロストール	抗 N S A I D 潰瘍剤
採用	サイプレジン 1 % 点眼液	シクロペントラート塩酸塩	屈折能検査点眼剤
採用	ザイボックス錠 6 0 0 m g	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
採用	ザイボックス注射液 6 0 0 m g	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
採用	サイモグロブリン点滴静注用 2 5 m g	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	免疫抑制剤
採用	サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
ハイアールト	サイレース静注 2 m g	フルニトラゼパム	麻酔導入剤
採用	サインバルタカプセル 2 0 m g	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
採用	ザクラス配合錠 H D	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	持続性 A T 1 レセプターブロッカー／持続性 C a 拮抗薬配合剤
採用	ザジテンドライシロップ 0 . 1 %	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
採用	ザノサー点滴静注用 1 g	ストレプトゾシン	抗悪性腫瘍剤
採用	ザファテック錠 1 0 0 m g	トレラグリプチンコハク酸塩	2 型糖尿病治療剤
採用	サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
採用	サホライド液歯科用 3 8 %	フッ化ジアンミン銀	
採用	サムスカ O D 錠 7 . 5 m g	トルバプタン	V 2 - 受容体拮抗剤
採用	サムタス点滴静注用 8 m g	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	V 2 - 受容体拮抗剤
採用	サラジェン顆粒 0 . 5 %	ピロカルピン塩酸塩	口腔乾燥症状改善薬
採用	サリグレンカプセル 3 0 m g	セビメリン塩酸塩水和物	口腔乾燥症状改善剤
採用	サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	人工唾液
採用	ザルティア錠 5 m g	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
採用	ザルトラップ点滴静注 1 0 0 m g	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ザルトラップ点滴静注 2 0 0 m g	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
試用	サルプレップ配合内用液	無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物	経口腸管洗浄剤
採用	サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「N P」	サルボグレラート塩酸塩	5 - H T 2 ブロッカー
採用	サンディ ミュン点滴静注用 2 5 0 m g	シクロスポリン	免疫抑制剤
採用	サンドスタチン L A R 筋注用キット 1 0 m g	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
採用	サンドスタチン L A R 筋注用キット 2 0 m g	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
採用	サンドスタチン L A R 筋注用キット 3 0 m g	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
採用	サンピロ点眼液 2 %	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0 . 1 %	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤
採用	サンリズムカプセル 5 0 m g	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤
採用	サンリズム注射液 5 0	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤
採用	ジアグノグリーン注射用 2 5 m g	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
採用	シアノキット注射用5 g セット	ヒドロキシコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
採用	シアノコバラミン注1 0 0 0 μ g 「NP」	シアノコバラミン	高単位ビタミンB 1 2 製剤
採用	ジーラスタ皮下注3. 6 m g	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型G－C S F 製剤
採用	ジーラスタ皮下注3. 6 m g ボディーポッド	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型G－C S F 製剤
採用	ジェイゾロフト錠2 5 m g	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
採用	ジェービックV	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	
採用	ジェニナック錠2 0 0 m g	メシル酸ガレノキサシン水和物	キノロン系経口抗菌剤
採用	ジェブタナ点滴静注6 0 m g	カバジタキセル アセトン付加物	抗悪性腫瘍剤
採用	シェルガン0. 5 眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	眼科手術補助剤
採用	ジクトルテープ7 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
採用	シグマート注4 8 m g	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤
採用	シクレスト舌下錠5 m g	アセナピンマレイン酸塩	抗精神病剤
採用	ジクロード点眼液0. 1 %	ジクロフェナクナトリウム	水溶性非ステロイド性抗炎症点眼剤
採用	シクロスポリンカプセル2 5 m g 「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制剤
採用	ジクロフェナクN a 錠2 5 m g 「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤1 2. 5 m g 「J G」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤2 5 m g 「J G」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤5 0 m g 「J G」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
採用	ジゴシン錠0. 1 2 5 m g	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
採用	ジゴシン注0. 2 5 m g	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
採用	シスプラチン点滴静注1 0 m g 「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	シスプラチン点滴静注5 0 m g 「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	ジスロマック細粒小児用1 0 %	アジスロマイシン水和物	1 5 員環マクロライド系抗生物質
採用	ジスロマック錠2 5 0 m g	アジスロマイシン水和物	1 5 員環マクロライド系抗生物質
採用	ジスロマック点滴静注用5 0 0 m g	アジスロマイシン水和物	1 5 員環マクロライド系抗生物質製剤
採用	シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤
採用	シナジス筋注液1 0 0 m g	パリビズマブ（遺伝子組換え）	抗R S ウイルスヒト化モノクローナル抗体
採用	シナジス筋注液5 0 m g	パリビズマブ（遺伝子組換え）	抗R S ウイルスヒト化モノクローナル抗体
採用	ジフェニドール塩酸塩錠2 5 m g 「トーワ」	ジフェニドール塩酸塩	抗めまい剤
採用	ジプレキサザイデイス錠2. 5 m g	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
採用	ジプレキサ筋注用1 0 m g	オランザピン	抗精神病剤
採用	ジプレキサ錠5 m g	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
採用	シプロキササン錠1 0 0 m g	シプロフロキサシン塩酸塩水和物	広範囲抗菌剤
採用	シプロフロキサシン点滴静注液4 0 0 m g 「ニプロ」	シプロフロキサシン	ニューキノロン系抗菌剤
採用	シベクトロ錠2 0 0 m g	テジゾリドリン酸エステル	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
採用	シベノール錠5 0 m g	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
採用	シベレスタットN a 点滴静注用1 0 0 m g 「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	好中球エラスターゼ阻害剤
採用	ジムソ膀胱内注入液5 0 %	ジメチルスルホキシド	間質性膀胱炎治療剤
採用	シムピコートタービュヘイラー6 0 吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	ドライパウダー吸入式喘息・C O P D 治療配合剤
採用	シムレクト静注用2 0 m g	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	急性拒絶反応抑制剤
採用	ジメチコン内用液2 % 「ホリイ」	ジメチコン	胃内有泡性粘液除去剤
採用	ジャディアンス錠1 0 m g	エンパグリフロジン	2 型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤
採用	シュアポスト錠0. 2 5 m g	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進剤
採用	ジョイクル関節注3 0 m g	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
採用	シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降9 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）	
採用	ジルチアゼム塩酸塩R カプセル1 0 0 m g 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	持続性C a 拮抗剤
採用	ジルチアゼム塩酸塩錠3 0 m g 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	C a 拮抗剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ジルテックドライシロップ1. 25%	セチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
採用	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール	抗血小板剤
採用	ジンジカインゲル20%	アミノ安息香酸エチル	局所麻酔剤
採用	シンビット静注用50mg	ニフェカラント塩酸塩	不整脈治療剤
採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
採用	スインプロイク錠0. 2mg	ナルデメジントシル酸塩	経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬
採用	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	糖尿病治療剤
採用	スーテントカプセル12. 5mg	スニチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	スーブレン吸入麻酔液	デスフルラン	全身吸入麻酔剤
試用	スガマデクス静注液200mg「バクスター」	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
採用	スキサメトニウム注100「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
採用	スキヤンドネストカートリッジ3%	メピバカイン塩酸塩	歯科用局所麻酔剤
採用	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
採用	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
採用	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
採用	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
採用	ステリクロンW液0. 05	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
採用	ステリクロンW液0. 1	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
採用	ステリクロンW液0. 5	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
採用	スピール膏M	サリチル酸	皮膚軟化剤
採用	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	COPD治療配合剤
採用	スピリーバ2. 5 μ gレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
採用	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧剤
採用	スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	スベニールディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
採用	スポンゼル	ゼラチン	止血用ゼラチンスポンジ
採用	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛治療剤
採用	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロン α 2b（NAMA-LWA）	天然型インターフェロン α 製剤
採用	スルバシリン静注用0. 75g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
採用	スルバシリン静注用1. 5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	抗潰瘍・精神用剤
採用	セイブル錠50mg	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤
採用	ゼジューラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	ゼスタッククリーム	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	経皮複合消炎剤
採用	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	高脂血症治療剤
採用	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安剤
採用	セパゾン錠1	クロキサゾラム	マイナートランキライザー
採用	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	合成セファロスポリン系抗生物質
採用	セファランチン末1%	セファランチン	抗アレルギー剤
採用	ゼフィックス錠100	ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
採用	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
採用	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質
採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	セフジトレン ピボキシル	セフェム系抗生物質
採用	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	セフェム系製剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	セフジニル錠１００mg「サワイ」	セフジニル	セフェム系製剤
採用	セフトアジジム静注用０．５g「NP」	セフトアジジム水和物	セフェム系抗生物質
採用	セフトアジジム静注用１g「NP」	セフトアジジム水和物	セフェム系抗生物質
採用	セフトリアキソンナトリウム静注用１g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
採用	セフボドキシムプロキセチルDS小児用５％「サワイ」	セフボドキシム　プロキセチル	セフェム系抗生物質
採用	セフボドキシムプロキセチル錠１００mg「SW」	セフボドキシム　プロキセチル	セフェム系抗生物質
採用	セフメタゾールNa静注用１g「NP」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
採用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	全身吸入麻酔剤
採用	セララ錠２５mg	エプレレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ハイアート	セルシン注射液１０mg	ジアゼパム	マイナートランキライザー
採用	セルセプトカプセル２５０	ミコフェノール酸　モフェチル	免疫抑制剤
採用	セレコキシブ錠１００mg「明治」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
採用	セレジストOD錠５mg	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症治療剤
採用	セレニカR顆粒４０％	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん，躁状態，片頭痛治療剤
採用	ゼローダ錠３００	カペシタビン	抗悪性腫瘍剤
採用	ゼンタコートカプセル３mg	ブデソニド	クローン病治療剤
採用	センノシド錠１２mg「サワイ」	センノシド	緩下剤
採用	ゾコーバ錠１２５mg	エンシトレルビル　フマル酸	抗SARS－CoV－2剤
採用	ソセゴン注射液１５mg	ペンタゾシン	鎮痛剤
採用	ソナゾイド注射用１６μL	ペルフルブタン	超音波診断用造影剤
採用	ゾニサミドOD錠２５mgTRE「SMP P」	ゾニサミド	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬
採用	ゾピクロン錠７．５mg「トーワ」	ゾピクロン	睡眠障害改善剤
採用	ゾビラックス眼軟膏３％	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤
採用	ゾビラックス錠２００	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
採用	ゾビラックス軟膏５％	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス外用剤
採用	ソフラチュール貼付剤１０cm	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤
採用	ゾフルーザ錠２０mg	バロキサビル　マルボキシル	抗インフルエンザウイルス剤
採用	ゾラデックス３．６mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	LH－RHアゴニスト
採用	ゾラデックスLA１０．８mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	LH－RHアゴニスト
採用	ソリクア配合注ソロスター	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤	持効型溶解インスリンアナログ製剤／GLP－1受容体作動薬
採用	ソリターT４号輸液	術後回復液	術後回復液
採用	ソリターT配合顆粒３号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	電解質剤
採用	ソリタックス－H輸液	維持液（ブドウ糖加）	電解質輸液（維持液－高張）
採用	ソル・コーテフ注射用１００mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
採用	ソル・メドロール静注用１２５mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
採用	ソル・メドロール静注用４０mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
採用	ソル・メドロール静注用５００mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
採用	ソルアセトF輸液	酢酸リンゲル液	酢酸リンゲル液
採用	ソルダクトン静注用２００mg	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
採用	ソルデム１輸液	開始液	開始液
採用	ソルデム１輸液	開始液	開始液
採用	ソルデム２輸液	脱水補給液	脱水補給液
採用	ソルデム３AG輸液	維持液	維持液 ７．５％糖加
採用	ソルデム３A輸液	維持液	維持液
採用	ソルデム３A輸液	維持液	維持液
採用	ソルデム３A輸液	維持液	維持液
採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤	持効型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP－1アナログ製剤
採用	ゾルピデム酒石酸塩錠５mg「DSEP」	ゾルピデム酒石酸塩	入眠剤
採用	ソルラクト輸液	乳酸リンゲル液	乳酸リンゲル液

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ゾレドロン酸点滴静注 4 m g ／ 5 m L 「サンド」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤
採用	ダブブロック錠 2 m g	ダブロデュスタット	H I F － P H 阻害薬
採用	ダイアート錠 6 0 m g	アゾセミド	持続型ループ利尿剤
採用	ダイアコート軟膏 0. 0 5 %	ジフロラゾン酢酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	ダイアアップ坐剤 6	ジアゼパム	小児用抗けいれん剤
採用	ダイアニール－ N P D － 4 1. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	ダイアニール－ N P D － 4 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	ダイアニール－ N P D － 4 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	ダイアモックス錠 2 5 0 m g	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
採用	ダイアモックス注射用 5 0 0 m g	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤
採用	タイケルブ錠 2 5 0 m g	ラパチニブトシル酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤
採用	ダイメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
採用	タイロゲン筋注用 0. 9 m g	ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤
ハイアート	ダウノマイシン静注用 2 0 m g	ダウノルビシン塩酸塩	抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤
採用	ダカルバジン注用 1 0 0	ダカルバジン	抗悪性腫瘍剤
採用	ダクチル錠 5 0 m g	ピペリドレート塩酸塩	平滑筋収縮緩和剤
採用	タグリッソ錠 8 0 m g	オシメルチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	タケキャブ錠 1 0 m g	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
採用	タケプロン静注用 3 0 m g	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター
採用	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	生物学的組織接着・閉鎖剤
採用	タゾピペ配合静注用 4. 5 「明治」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	β －ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
採用	タチオン注射用 2 0 0 m g	グルタチオン	グルタチオン製剤
採用	タナドーパ顆粒 7 5 %	ドカルパミン	ドパミンプロドラッグ
採用	タプロス点眼液 0. 0 0 1 5 %	タフルプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
採用	タベンタ錠 2 5 m g	タベンタドール塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
採用	タマガワヨードホルムガーゼ	ヨードホルム	
採用	タミフルカプセル 7 5	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
採用	タミフルドライシロップ 3 %	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
採用	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0. 2 m g 「明治」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
採用	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	ヒト型抗 C D 3 8 モノクローナル抗体／ヒアルロン酸分解酵素配合剤
採用	ダラザレックス点滴静注 1 0 0 m g	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗 C D 3 8 モノクローナル抗体
採用	ダラザレックス点滴静注 4 0 0 m g	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗 C D 3 8 モノクローナル抗体
採用	ダラシンカプセル 1 5 0 m g	クリンダマイシン塩酸塩	リンコマイシン系抗生物質
試用	タリージェ O D 錠 1 0 m g	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
採用	タリージェ O D 錠 5 m g	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
採用	タリオン錠 1 0 m g	ベポタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミン H 1 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
採用	タリビッド眼軟膏 0. 3 %	オフロキサシン	広範囲抗菌点眼剤
採用	タリビッド耳科用液 0. 3 %	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
採用	タルセバ錠 1 5 0 m g	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	ダルベポエチン アルファ注 1 2 0 μ g シリンジ「K K F」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ダルベポエチン アルファ注 2 0 μ g シリンジ「K K F」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ダルベポエチン アルファ注 3 0 μ g シリンジ「K K F」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ダルベポエチン アルファ注 4 0 μ g シリンジ「K K F」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ダルベポエチン アルファ注 6 0 μ g シリンジ「K K F」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ダントリウムカプセル 2 5 m g	ダントロレンナトリウム水和物	痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ダントリウム静注用 2 0 m g	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤
採用	タンニン酸アルブミン「メタル」	タンニン酸アルブミン	止瀉剤
採用	タンボコール静注 5 0 m g	フレカイニド酢酸塩	頻脈性不整脈治療剤
採用	チアブリド錠 2 5 m g 「サワイ」	チアブリド塩酸塩	チアブリド製剤
採用	チエナム点滴静注用 0. 5 g	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	カルバペネム系抗生物質
採用	チガソンカプセル 1 0	エトレチナート	角化症治療剤
採用	チザニジン錠 1 m g 「トーフ」	チザニジン塩酸塩	筋緊張緩和剤
採用	チョコラ A 末 1 万単位／ g	ビタミン A	ビタミン A 剤
採用	チラーヂン S 錠 5 0 μ g	レボチロキシナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
採用	ツイミーグ錠 5 0 0 m g	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤
採用	ツインライン N F 配合経腸用液	経腸成分栄養剤	消化態経腸栄養剤
採用	ソートラム錠 5 0 m g	トラマドール塩酸塩	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤
採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	加味逍遙散エキス	漢方製剤
採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	葛根湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	牛車腎気丸エキス	漢方製剤
採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	桂枝茯苓丸エキス	漢方製剤
採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	五苓散エキス	漢方製剤
採用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	柴苓湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	十全大補湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	小柴胡湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	人参養栄湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	大建中湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	当帰芍薬散エキス	漢方製剤
採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	麦門冬湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	半夏厚朴湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	半夏瀉心湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	補中益気湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	抑肝散エキス	漢方製剤
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	六君子湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	芍薬甘草湯エキス	漢方製剤
採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	茵ちん蒿湯エキス	漢方製剤
採用	ツロブテロールテープ 2 m g 「久光」	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤
採用	テイコプラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「日工」	テイコプラニン	グリコペプチド系抗生物質製剤
採用	ディスオーパ消毒液 0. 5 5 %	フタラール	
採用	ディナゲスト錠 1 m g	ジエノゲスト	子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤
採用	ディフェリングル 0. 1 %	アダパレン	尋常性ざ瘡治療剤
採用	デエビゴ錠 2. 5 m g	レンボレキサント	不眠症治療剤
採用	デエビゴ錠 5 m g	レンボレキサント	不眠症治療剤
採用	テオドール錠 1 0 0 m g	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
採用	デカドロン錠 0. 5 m g	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
採用	デキサート注射液 6. 6 m g	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
採用	デキサメタゾン口腔用軟膏 0. 1 % 「N K」	デキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤
ハイアート	デクスメドミジン静注液 2 0 0 μ g ／ 5 0 m L シリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	α 2 作動性鎮静剤
採用	テグレトール細粒 5 0 %	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
採用	テグレトール錠 1 0 0 m g	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
採用	テグレトール錠 2 0 0 m g	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
採用	デザレックス錠 5 m g	デスロラタジン	持続性選択 H 1 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
採用	デスモプレシン静注 4 μ g 「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	第 V I I I 因子放出型血友病 A ・ v o n W i l l e b r a n d 病用剤
採用	デスモプレシン点鼻スプレー 2. 5 μ g 「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	中枢性尿崩症用剤
採用	テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	テタノブリン I H 静注 2 5 0 単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	デトキソール静注液 2 g	チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	エピジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩	歯科用抗生物質製剤
採用	テネリアOD錠 20 mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	2型糖尿病治療剤
採用	デノシン点滴静注用 500 mg	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤
採用	デパケンR錠 100 mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
採用	デパケンR錠 200 mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
採用	デヒドロコール酸注射液	デヒドロコール酸	利胆剤
採用	デファイテリオ静注 200 mg	デフィプロチドナトリウム	肝類洞閉塞症候群治療剤
採用	テプレノンカプセル 50 mg 「サワイ」	テプレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤
採用	デプロメール錠 25	フルボキサミンマレイン酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
採用	デベルザ錠 20 mg	トログリフロジン水和物	2型糖尿病治療剤
仮採用	テムセルHS注	ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞	ヒト体性幹細胞加工製品
採用	テモゾロミド錠 100 mg 「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
採用	テモゾロミド錠 20 mg 「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
採用	テモダール点滴静注用 100 mg	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
採用	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療配合剤
採用	デュピクセント皮下注 300 mg ペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-4／IL-13受容体モノクローナル抗体
採用	テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤
ハイアラート	テラルビシン注射用 10 mg	ピラルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質
採用	テリボン皮下注 28.2 μg オートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
採用	テリルジー100エリプタ30吸入用	メクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフルテリル酢酸塩／ノルカルボン酸エヘノール・ソ	喘息・COPD治療配合剤
採用	テリルジー200エリプタ30吸入用	メクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフルテリル酢酸塩／ノルカルボン酸エヘノール・ソ	喘息治療配合剤
採用	テルミサルタン錠 40 mg 「DSEP」	フェニル酢酸塩 テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
採用	デルモベートスカルプローション 0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	デルモベート軟膏 0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	テルモ生食	生理食塩液	生理食塩液
採用	テルモ生食	生理食塩液	生理食塩液
採用	テレミンソフト坐薬 2 mg	ビスコジル	排便機能促進剤
採用	ドキシル注 20 mg	ドキシソルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
ハイアラート	ドキシソルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	ドキシソルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
ハイアラート	ドキシソルビシン塩酸塩注射用 50 mg 「NK」	ドキシソルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「サワイ」	トコフェロールニコチン酸エステル	微小循環系賦活剤
採用	ドセタキセル点滴静注 20 mg／1 mL 「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
採用	ドセタキセル点滴静注 80 mg／4 mL 「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
採用	トチモトのダイオウ末	ダイオウ	生薬
採用	ドパストン静注 50 mg	レボドパ	パーキンソニズム治療剤
採用	トビエース錠 4 mg	フェソテロジンフマル酸塩	過活動膀胱治療剤
採用	トプシムローション 0.05%	フルオシノニド	外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	トプシム軟膏 0.05%	フルオシノニド	外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	ドプスOD錠 100 mg	ドロキシドパ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
採用	ドブタミン持続静注 150 mg シリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
採用	ドブトレックス注射液 100 mg	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤，心臓疾患診断補助剤
採用	トブラシン注 60 mg	トブラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
採用	トブラシン点眼液 0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生物質

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ドラル錠15	クアゼパム	睡眠障害改善剤
仮採用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
仮採用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	ループ利尿剤
採用	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	2型糖尿病治療剤
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	抗うつ剤
採用	トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
採用	トラネキサム酸注1000mg／10mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
採用	トラバタンズ点眼液0.004%	トラバプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
採用	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
採用	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤
採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	トリアゾラム	睡眠導入剤
採用	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	催眠剤
採用	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤
採用	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素	再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤
採用	トリビック	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	
採用	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤
採用	トリプタノール錠25	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤
採用	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤
採用	トルソプト点眼液1%	ドルゾラムド塩酸塩	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤
採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	持続性GLP-1受容体作動薬
採用	トレランG液75g	デンブン部分加水分解物	糖忍容力試験用糖質液
採用	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
採用	トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
採用	ドレニゾンテープ4μg／cm2	フルドロキシコルチド	皮膚疾患用密封療法剤
採用	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
ハイアート	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	麻酔用神経遮断剤
採用	トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン	止血剤
採用	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン	消化管運動改善剤
採用	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	消化管運動改善剤
採用	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	消化管運動改善剤
採用	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
採用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
採用	ナトリックス錠1	インダパミド	持続型非チアジド系降圧剤
採用	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	一本鎖ヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
採用	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
採用	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
採用	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
採用	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤
採用	ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤
採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ニコランジル錠 5 m g 「トーワ」	ニコランジル	狭心症治療剤
採用	ニセルゴリン錠 5 m g 「トーワ」	ニセルゴリン	脳循環・代謝改善剤
採用	ニゾラルクリーム 2 %	ケトコナゾール	抗真菌剤
採用	ニゾラルローション 2 %	ケトコナゾール	抗真菌剤
ハイアート	ニドラン注射用 5 0 m g	ニムスチン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	ニトロールRカプセル 2 0 m g	硝酸イソソルビド	長時間作用型虚血性心疾患治療剤
採用	ニトロール注 5 m g シリンジ	硝酸イソソルビド	0. 0 5 %硝酸イソソルビド点滴静注用製剤
採用	ニトログリセリン注 2 5 m g／5 0 m L シリンジ「テルモ」	ニトログリセリン	ニトログリセリン注射液
採用	ニトロペン舌下錠 0. 3 m g	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠
採用	ニフェジピンC R錠 2 0 m g 「トーワ」	ニフェジピン	持続性C a拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
採用	ニュープロパッチ 9 m g	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
採用	ニューモバックスN Pシリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
採用	ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g ペン	メポリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗I L－5モノクローナル抗体
採用	ネオール内用液 1 0 %	シクロスボリン	免疫抑制剤
採用	ネオクリーナー「セキネ」	次亜塩素酸ナトリウム	根管清掃剤
採用	ネオシネジンコーワ 5 %点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
採用	ネオシネジンコーワ注 1 m g	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤
採用	ネオステリングリーンうがい液 0. 2 %	ベンゼトニウム塩化物	口腔洗浄・含嗽剤
採用	ネオビタカイン注シリンジ 5 m L	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
採用	ネオフィリン注 2 5 0 m g	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
採用	ネオメドロールE E軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン	眼科・耳鼻科疾患治療剤
採用	ネオレスタール注射液 1 0 m g	d l－クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包 1 0 m g	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター
採用	ネксаバル錠 2 0 0 m g	ソラフェニブトシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	ネシーナ錠 2 5 m g	アログリプチン安息香酸塩	2型糖尿病治療剤
採用	ネスブ注射液 1 2 0 μ g プラシリンジ	ダルベポエチン α（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 %	ネパフェナク	非ステロイド性抗炎症点眼剤
採用	ネリゾナユニバーサルクリーム 0. 1 %	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	ノイアート静注用 5 0 0 単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンI I I	血液凝固阻止剤
採用	ノイキノン錠 1 0 m g	ユビデカレノン	代謝性強心剤
採用	ノイトロジン注 1 0 0 μ g	レノグラスチム（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒトG－C S F製剤
採用	ノイトロジン注 2 5 0 μ g	レノグラスチム（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒトG－C S F製剤
採用	ノイロトロピン錠 4 単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
採用	ノイロトロピン注射液 3. 6 単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	疼痛性・アレルギー性疾患治療剤
採用	ノウリアスト錠 2 0 m g	イストラデフィリン	アデノシンA 2 A受容体拮抗薬
採用	ノーベルバル静注用 2 5 0 m g	フェノバルビタールナトリウム	抗けいれん剤
採用	ノバクトM静注用 1 0 0 0 単位	乾燥濃縮人血液凝固第I X因子	血漿分画製剤
採用	ノバスタンH I注 1 0 m g／2 m L	アルガトロバン水和物	選択的抗トロンビン剤
採用	ノバミン錠 5 m g	プロクロルペラジンマレイン酸塩	精神神経用剤
ハイアート	ノバントロン注 1 0 m g	ミトキサントロン塩酸塩	アントラキノン系抗悪性腫瘍剤
採用	ノボラピッド3 0ミックス注 フレックスペン	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤
採用	ノボラピッド注 フレックスタッチ	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
採用	ノボラピッド注 ペンフィル	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
採用	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
採用	ノルアドリナリン注 1 m g	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
採用	パージェタ点滴静注 4 2 0 m g／1 4 m L	ペルツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ハーセプチン注射用 1 5 0	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ハーセプチン注射用 6 0	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	パーロデル錠 2. 5 m g	ブロモクリプチンメシル酸塩	持続性ドパミン作動剤
採用	バイアスピリン錠 1 0 0 m g	アスピリン	抗血小板剤
採用	ハイアミン液 1 0 %	ベンゼトニウム塩化物	殺菌消毒剤
採用	ハイカムチン注射用 1. 1 m g	ノギテカン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	ハイカリックR F輸液	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
採用	ハイカリック液－1号	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
採用	ハイカリック液－2号	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
採用	ハイドレアカプセル 5 0 0 m g	ヒドロキシカルバミド	抗悪性腫瘍剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ハイポエタノール液２％「ケンエー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	外皮用殺菌消毒剤
採用	ハイボン錠２０ｍｇ	リボフラビン酪酸エステル	高コレステロール血症改善ビタミン剤
採用	パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
採用	パキロビットパック３００	ニルマトレルビル・リトナビル	抗ウイルス剤
採用	パキロビットパック６００	ニルマトレルビル・リトナビル	抗ウイルス剤
採用	バクタミニ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤
採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤
採用	バクトロバン鼻腔用軟膏２％	ムピロシンカルシウム水和物	鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤
採用	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	沈降１５価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）	
採用	パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
採用	パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
採用	パセトシン細粒１０％	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤
試用	パドセブ点滴静注用２０ｍｇ	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	パドセブ点滴静注用３０ｍｇ	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	パナルジン錠１００ｍｇ	チクロピジン塩酸塩	抗血小板剤
採用	パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」	パパベリン塩酸塩	血管拡張・鎮痙剤
採用	バビースモ硝子体内注射液１２０ｍｇ／ｍＬ	ファリシマブ（遺伝子組換え）	眼科用ＶＥＧＦ／Ａｎｇ－２阻害剤
採用	バフセオ錠１５０ｍｇ	バダデュスタット	腎性貧血治療剤
採用	ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」	人ハプトグロビン	血漿分画製剤
採用	ハベカシン注射液２００ｍｇ	アルベカシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
採用	バベンチオ点滴静注２００ｍｇ	アベルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液１０％＊（ＡＦＰ）	パラアミノ馬尿酸ナトリウム	腎機能検査用薬
採用	ハラヴェン静注１ｍｇ	エリブリンメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	バラクルード錠０．５ｍｇ	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
採用	バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
採用	バラシクロビル顆粒５０％「ＳＰＫＫ」	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
採用	パリエット錠５ｍｇ	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
採用	バリエネマ３００	硫酸バリウム	ディスポーザブル注腸造影剤
採用	バリキサ錠４５０ｍｇ	バルガンシクロビル塩酸塩	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
採用	ハリケインゲル歯科用２０％	アミノ安息香酸エチル	局所麻酔剤
採用	ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ	アムホテリシンＢ	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
採用	バリトゲンＨＤ	硫酸バリウム	消化管Ｘ線造影剤
採用	バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」	バルサルタン	選択的ＡＴ１受容体ブロッカー
採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
採用	パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入	ブデソニド	ドライパウダー吸入式ステロイド剤
採用	パルミコート吸入液０．５ｍｇ	ブデソニド	吸入ステロイド喘息治療剤
採用	パルモディアXR錠０．２ｍｇ	ペマフィブラート	高脂血症治療剤
採用	ハルロピテープ８ｍｇ	ロピニロール塩酸塩	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
採用	バレイショデンプン「ケンエー」	バレイショデンプン	賦形剤
採用	バロス発泡顆粒－Ｓ	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	Ｘ線診断二重造影用発泡剤
採用	パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
採用	ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤
採用	ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤
採用	バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
採用	パンテチン錠１００ｍｇ「シオエ」	パンテチン	パンテチン製剤
採用	パントール注射液５００ｍｇ	パンテノール	パンテノール製剤
採用	パントシン散２０％	パンテチン	パンテチン製剤
採用	ハンプ注射用１０００	カルペリチド（遺伝子組換え）	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ビ・シフロール錠0. 5 m g	プラミペキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
採用	ヒアルロン酸N a 0. 8 5 眼粘弾剤1 %「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
採用	ヒアレイン点眼液0. 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療剤
採用	ビーエスエスプラス5 0 0 眼灌流液0. 0 1 8 4 %	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
採用	ビーゾカイン歯科用ゼリー2 0 %	アミノ安息香酸エチル	歯科用表面麻酔剤
採用	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB 1・糖・電解質・アミノ酸液
採用	ビームゲン注0. 2 5 m L	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	ウイルスワクチン類
採用	ヒーロンV 眼粘弾剤2. 3 %シリンジ0. 6 m L	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
採用	ヒーロン眼粘弾剤1 %シリンジ0. 8 5 m L	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
採用	ピオグリタゾンOD錠3 0 m g「ケミファ」	ピオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
採用	ビオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤
採用	ビオスリー配合散	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤
採用	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤	耐性乳酸菌整腸剤
採用	ビオフェルミン配合散	ラクトミン	乳酸菌整腸剤
採用	ビカネイト輸液	重炭酸リンゲル液	細胞外液補充液
採用	ビカネイト輸液	重炭酸リンゲル液	細胞外液補充液
採用	ビカルタミドOD錠8 0 m g「NK」	ビカルタミド	前立腺癌治療剤
採用	ビクシリン注射用1 g	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質
採用	ピコスルファートナトリウム内用液0. 7 5 %「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤
採用	ビジパーク2 7 0 注1 0 0 m L	イोजキサノール	非イオン性等浸透圧造影剤
採用	ビジパーク2 7 0 注2 0 m L	イोजキサノール	非イオン性等浸透圧造影剤
採用	ピシバニール注射用5 K E	溶連菌抽出物	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤
採用	ビスコート0. 5 眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	眼科手術補助剤
採用	ビスダイн静注用1 5 m g	ベルテポルフィン	加齢黄斑変性症治療剤
採用	ビソノテープ4 m g	ビソプロロール	経皮吸収型・ β 1 遮断剤
採用	ビダーザ注射用1 0 0 m g	アザンチジン	骨髄異形成症候群治療剤
採用	ビタノイリンカプセル5 0	フルスルチアミン・B 2・B 6・B 1 2 配合剤	複合ビタミンB 剤
採用	ピタバスタチンC a・OD錠2 m g「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	HMG－C o A 還元酵素阻害剤
採用	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B 6・B 1 2 配合剤	複合ビタミン剤
採用	ビダラビン軟膏3 %「SW」	ビダラビン	抗ウイルス剤
採用	ヒトC R H 静注用1 0 0 μ g「ニプロ」	コルチコレリン（ヒト）	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
採用	ピドキサール錠1 0 m g	ピリドキサルリン酸エステル水和物	活性型ビタミンB 6 製剤
採用	ピトレシン注射液2 0	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
採用	ヒドロコルチゾンリン酸エステルN a 静注液1 0 0 m g「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
採用	ビプレッソ徐放錠5 0 m g	クエチアピンフマル酸塩	双極性障害のうつ症状治療剤
採用	ピペラシリンN a 注射用2 g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム	合成ペニシリン製剤
採用	ピマリシン眼軟膏1 %「センジュ」	ピマリシン	抗真菌剤
採用	ビムパット錠5 0 m g	ラコサミド	抗てんかん剤
採用	ビムパット点滴静注1 0 0 m g	ラコサミド	抗てんかん剤
採用	ピモベンダン錠1. 2 5 m g「TE」	ピモベンダン	心不全治療薬
ハイアート	ヒューマリンR 注1 0 0 単位／m L	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
採用	ヒューマログミックス5 0 注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
採用	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
採用	ヒュミラ皮下注4 0 m g ペン0. 4 m L	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトT N F α モノクローナル抗体製剤
採用	ビラノアOD錠2 0 m g	ビラスチン	アレルギー性疾患治療剤
採用	ピラマイド原末	ピラジナミド	結核化学療法剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ビリスコピン点滴静注 5 0	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
採用	ヒルドイドソフト軟膏 0. 3 %	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
採用	ヒルドイドローション 0. 3 %	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
採用	ヒルトニン 0. 5 m g 注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療・ T S H 分泌機能検査用剤
採用	ヒルナミン錠（ 2 5 m g ）	レボメプロマジンマレイン酸塩	精神神経用剤
採用	ビレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	C O P D 治療配合剤
採用	ピレチア錠（ 2 5 m g ）	プロメタジン塩酸塩	抗ヒスタミン・抗パーキンソン剤
採用	ピレノキシシシ懸濁性点眼液 0. 0 0 5 % 「参天」	ピレノキシシシ	老人性白内障治療剤
採用	ファーストシン静注用 0. 5 g	セフォゾプラン塩酸塩	セフェム系抗生物質
採用	ファーストシン静注用 1 g	セフォゾプラン塩酸塩	セフェム系抗生物質
採用	ファイバ静注用 1 0 0 0	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	血漿分画製剤
採用	ファムビル錠 2 5 0 m g	ファムシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
採用	ファモチジン D 錠 1 0 m g 「 E M E C 」	ファモチジン	H 2 受容体拮抗剤
採用	ファモチジン散 2 % 「トーワ」	ファモチジン	H 2 受容体拮抗剤
採用	ファモチジン錠 2 0 「サワイ」	ファモチジン	H 2 受容体拮抗剤
採用	ファンギゾン注射用 5 0 m g	アムホテリシン B	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤
採用	フィコンパ錠 2 m g	ペランパネル水和物	抗てんかん剤
試用	フィコンパ点滴静注用 2 m g	ペランパネル水和物	抗てんかん剤
採用	フィジオ 1 4 0 輸液	酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）	細胞外液補給液
採用	フィジオ 3 5 輸液	維持液（ブドウ糖加）	維持液
採用	フィニバックス点滴静注用 0. 5 g	ドリペネム水和物	カルバペネム系抗生物質製剤
採用	ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤
採用	ブイフェンド錠 2 0 0 m g	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤
採用	フィブラストスプレー 5 0 0	トラフェルミン（遺伝子組換え）	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
採用	フィブリノゲン H T 静注用 1 g 「 J B 」	乾燥人フィブリノゲン	血漿分画製剤（血液凝固剤）
採用	フィプロガミン P 静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第 X Ⅱ Ⅲ 因子	血漿分画製剤／乾燥濃縮人血液凝固第 X Ⅱ Ⅲ Ⅰ 因子製剤
仮採用	フィルグラスチム B S 注 1 5 0 μ g シリンジ「 F 」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G－C S F 製剤
仮採用	フィルグラスチム B S 注 3 0 0 μ g シリンジ「 F 」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G－C S F 製剤
仮採用	フィルグラスチム B S 注 7 5 μ g シリンジ「 F 」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G－C S F 製剤
採用	フェインジェクト静注 5 0 0 m g	カルボキシマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤
採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
採用	フェジン静注 4 0 m g	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
試用	フェスゴ配合皮下注 I N	ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗 H E R 2 ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤
採用	フェスゴ配合皮下注 M A	ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗 H E R 2 ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤
採用	フェソロデックス筋注 2 5 0 m g	フルベストラント	抗エストロゲン剤／乳癌治療剤
採用	フェノール「東海」	フェノール	殺菌消毒剤
採用	フェノバル散 1 0 %	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん剤
採用	フェブリク錠 2 0 m g	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤
採用	フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」	フェルビナク	経皮吸収型鎮痛・消炎剤
採用	フェルビナクパップ 7 0 m g 「 N P 」	フェルビナク	経皮鎮痛消炎剤
採用	フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g	乾燥硫酸鉄	徐放型鉄剤
採用	フェンタニル注射液 0. 1 m g 「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
採用	フェンタニル注射液 0. 5 m g 「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
採用	フェントステープ 0. 5 m g	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
採用	フェントステープ 1 m g	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
採用	フェントステープ 2 m g	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	フェントステープ8 m g	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
採用	フオイパン錠1 0 0 m g	カモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
採用	フォシーガ錠1 0 m g	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的S G L T 2 阻害剤
採用	フォシーガ錠5 m g	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的S G L T 2 阻害剤
採用	フォリアミン錠	葉酸	葉酸製剤
採用	ブコラム口腔用液2. 5 m g	ミダゾラム	抗けいれん剤
採用	ブスコパン錠1 0 m g	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
採用	ブスコパン注2 0 m g	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
ハイアート	ブスルフェクス点滴静注用6 0 m g	ブスルファン	造血幹細胞移植前治療剤
採用	ブドウ糖「フソー」	ブドウ糖	糖類剤
採用	ブドウ糖注1 0 %バッグ「フソー」	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	ブドウ糖注5 %P L 「フソー」	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	ブドウ糖注5 0 %P L 「フソー」	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	フラグミン静注5 0 0 0 単位／5 m L	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
採用	プラザキサカプセル1 1 0 m g	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンビン阻害剤
採用	プラザキサカプセル7 5 m g	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンビン阻害剤
採用	フラジール内服錠2 5 0 m g	メトロニダゾール	抗原虫剤
採用	フラジール腔錠2 5 0 m g	メトロニダゾール	抗トリコモナス剤
採用	プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	黄体・卵胞ホルモン配合剤
採用	プラバスタチンN a 塩錠1 0 m g 「タナベ」	プラバスタチンナトリウム	高脂血症治療剤
採用	プラリア皮下注6 0 m g シリンジ	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗R A N K L モノクローナル抗体製剤
採用	プランルカストカプセル1 1 2. 5 m g 「サワイ」	プランルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
採用	プリズバインド静注液2. 5 g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	ダビガトラン特異的中和剤
採用	ブリディオン静注2 0 0 m g	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
採用	プリンペラン注射液1 0 m g	塩酸メトクロプラミド	消化器機能異常治療剤
採用	フルービックH A シリンジ	インフルエンザH A ワクチン	
採用	フルオール・ゼリー歯科用2 %	フッ化ナトリウム	
採用	フルオレサイト静注5 0 0 m g	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤
採用	フルオロウラシル注1 0 0 0 m g 「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
採用	フルオロウラシル注2 5 0 m g 「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
採用	フルカリック1 号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
採用	フルカリック1 号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
採用	フルカリック2 号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
採用	フルカリック2 号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
採用	フルカリック3 号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
採用	フルコナゾールカプセル1 0 0 m g 「サワイ」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
採用	フルダラ静注用5 0 m g	フルダラビンリン酸エステル	抗悪性腫瘍剤
採用	フルティフォーム1 2 5 エアゾール1 2 0 吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	喘息治療配合剤
採用	フルニトラゼパム錠1 m g 「アメル」	フルニトラゼパム	睡眠導入剤
採用	フルマゼニル静注0. 5 m g シリンジ「テルモ」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
採用	フルマリン静注用1 g	フロモキシセフナトリウム	オキサセフェム系抗生物質
採用	フルメトロン点眼液0. 1 %	フルオロメトロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
採用	プレアミン－P 注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	小児T P N 用総合アミノ酸製剤
採用	ブレオ注射用1 5 m g	ブレオマイシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
採用	プレガバリンO D 錠7 5 m g 「V T R S」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
採用	プレグランディン腔坐剤1 m g	ゲメプロスト	P G E 1 誘導体制剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
ハイアラート	プレセデックス静注液 2 0 0 μ g ／ 5 0 m L シリンジ「ファイザー」	デクスメデトミジン塩酸塩	α 2 作動性鎮静剤
採用	ブレディニンOD錠 5 0	ミゾリビン	免疫抑制剤
採用	プレドニゾロン散「タケダ」 1 %	プレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	プレドニゾロン錠 1 m g （旭化成）	プレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	プレドニン錠 5 m g	プレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	プレベナー 1 3 水性懸濁注	沈降 1 3 価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性 変異ジフテリア毒素結合体）	
採用	プレマリン錠 0. 6 2 5 m g	結合型エストロゲン	結合型エストロゲン製剤
採用	プレミネント配合錠 L D	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド 配合剤	持続性 A R B ／利尿薬合剤
採用	プロウペス腔用剤 1 0 m g	ジノプロストン	
採用	プログラフカプセル 0. 5 m g	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
採用	プログラフカプセル 1 m g	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
採用	プログラフ注射液 2 m g	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
採用	プログラフ顆粒 0. 2 m g	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
採用	プロジフ静注液 2 0 0	ホスフルコナゾール	深在性真菌症治療剤
採用	プロスコープ 3 0 0 注シリンジ 1 0 0 m L	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
採用	プロスタール錠 2 5	クロルマジノン酢酸エステル	前立腺肥大症・癌治療剤
採用	プロスタグランジン E 2 錠 0. 5 m g 「科 研」	ジノプロストン	陣痛誘発・促進剤
採用	プロスタルモン・F 注射液 1 0 0 0	ジノプロスト	P G F 2 α 製剤
採用	プロスタンディン注射用 2 0 μ g	アルプロスタジル アルファデクス	P G E 1 製剤
採用	プロスタンディン点滴静注用 5 0 0 μ g	アルプロスタジル アルファデクス	P G E 1 製剤
採用	プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %	アルプロスタジル アルファデクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
採用	フロセミド細粒 4 % 「E M E C」	フロセミド	利尿降圧剤
採用	フロセミド錠 4 0 m g 「J G」	フロセミド	利尿降圧剤
採用	フロセミド注 2 0 m g 「N I G」	フロセミド	利尿降圧剤
採用	プロタノール L 注 0. 2 m g	l - イソプレナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
採用	プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
採用	プロチゾラム OD 錠 0. 2 5 m g 「サワイ」	プロチゾラム	睡眠導入剤
採用	プロトピック軟膏 0. 1 %	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
採用	プロナーゼ M S	プロナーゼ	胃内粘液溶解除去剤
採用	ブロナック点眼液 0. 1 %	ブロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド抗炎症点眼剤
採用	プロハンス静注シリンジ 1 3 m L	ガドテリドール	環状型非イオン性 M R I 用造影剤
ハイアラート	プロポフォール静注 1 % 2 0 m L 「マルイ シ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静用剤
採用	プロマック D 錠 7 5	ポラプレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 % 「タイ ヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
採用	フロモックス小児用細粒 1 0 0 m g	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
採用	フロリードゲル経口用 2 %	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤
試用	ベイフォータス筋注 5 0 m g シリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	抗 R S ウイルスヒトモノクローナル抗体製剤
採用	ベオーバ錠 5 0 m g	ビベグロン	選択的 β 3 アドレナリン受容体作動性過活動 膀胱治療剤
採用	ベオビュ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g ／ m L	ブロールシズマブ（遺伝子組換え）	眼科用 V E G F 阻害剤
採用	ペガシス皮下注 1 8 0 μ g	ペグインターフェロン アルファ - 2 a （遺 伝子組換え）	ペグインターフェロン - α - 2 a 製剤
採用	ペガモックス点眼液 0. 5 %	モキシフロキサシン塩酸塩	広範囲抗菌点眼剤
採用	ヘキザックスクラブ	クロルヘキシジングルコン酸塩	
採用	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g	パニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ベクティビックス点滴静注 4 0 0 m g	パニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
仮採用	ペグフィルグラスチム B S 皮下注 3. 6 m g 「モチダ」	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型 G - C S F 製剤
採用	ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g	レムデシビル	抗ウイルス剤
採用	ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 m g 「サワ イ」	ベザフィブラート	高脂血症治療剤
採用	ベシカム軟膏 5 %	イブプロフェンピコノール	非ステロイド系消炎・鎮痛剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ベストロン耳鼻科用１％	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生物質
採用	ベストロン点眼用０．５％	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生物質
採用	ベタニス錠５０ｍｇ	ミラベグロン	選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤
採用	ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位	インターフェロン　ベータ－１b（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターフェロンβ－１b製剤
採用	ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	ベナンボックス注用３００ｍｇ	ペンタミジンイセチオン酸塩	カリニ肺炎治療剤
採用	ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗剤）
採用	ベネフィクス静注用１０００	ノナコグアルファ（遺伝子組換え）	遺伝子組換え血液凝固第ⅠX因子製剤
採用	ベノキシール点眼液０．４％	オキシブプロカイン塩酸塩	眼科用表面麻酔剤
仮採用	ベバシズマブBS点滴静注１００ｍｇ「第一三共」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
仮採用	ベバシズマブBS点滴静注４００ｍｇ「第一三共」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ヘパリンCa皮下注１万単位／０．４ｍＬ「サワイ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
採用	ヘパリンNaロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
ハイアート	ヘパリンNa注５千単位／５ｍＬ「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
採用	ヘパリンNa透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
採用	ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
採用	ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
採用	ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
採用	ヘパンED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤
採用	ベピオゲル２．５％	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
採用	ヘブスブリンIH静注１０００単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	血漿分画製剤
採用	ヘプタバックスーⅡⅡ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	ウイルスワクチン類
採用	ベプリジル塩酸塩錠１００ｍｇ「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	頻脈性不整脈・狭心症治療剤
採用	ベムリディ錠２５ｍｇ	テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
採用	ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「NK」	ペメトレキセドナトリウム水和物	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
採用	ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ「NK」	ペメトレキセドナトリウム水和物	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
採用	ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤
採用	ベラプロストNa錠２０μｇ「サワイ」	ベラプロストナトリウム	PGI２誘導体制剤
採用	ペリアクチン散１％	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
採用	ペリオクリン歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩	歯周炎治療剤
採用	ベリキューボ錠２．５ｍｇ	ベルイシグアト	慢性心不全治療剤
採用	ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	消化酵素剤
採用	ベリプラストPコンビセット　組織接着用	フィブリノゲン加第XⅡⅡⅡ因子	血漿分画製剤（生理的組織接着剤）
採用	ベリプラストPコンビセット　組織接着用	フィブリノゲン加第XⅡⅡⅡ因子	血漿分画製剤（生理的組織接着剤）
採用	ベルケイド注射用３ｍｇ	ボルテゾミブ	抗悪性腫瘍剤
採用	ペルサンチン錠１００ｍｇ	ジピリダモール	抗血小板剤
採用	ペルサンチン錠２５ｍｇ	ジピリダモール	冠循環改善剤
採用	ベルソムラ錠１５ｍｇ	スボレキサント	不眠症治療剤
採用	ベルソムラ錠２０ｍｇ	スボレキサント	不眠症治療剤
採用	ヘルベッサー注射用１０	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤
採用	ベンザリン錠５	ニトラゼパム	睡眠誘導・抗痙攣剤
採用	ベンザルコニウム塩化物消毒液１０％「東海」	ベンザルコニウム塩化物	殺菌消毒剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	ペンタサ顆粒 9 4 %	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
採用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g ／ 4 m L 「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 2 5 m g ／ 1 m L 「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	ベンリスタ点滴静注用 1 2 0 m g	ベリムマブ（遺伝子組換え）	完全ヒト型抗 B L y S モノクローナル抗体製剤
採用	ペンレステープ 1 8 m g	リドカイン	貼付用局所麻酔剤
採用	ボグリボース O D 錠 0 . 3 m g 「トーワ」	ボグリボース	糖尿病食後過血糖改善剤
採用	ホスアプレピタント点滴静注用 1 5 0 m g 「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	選択的 N K 1 受容体拮抗型制吐剤
採用	ホスコ H - 1 5	ウイテプゾール	坐剤基剤
採用	ホストイン静注 7 5 0 m g	ホスフェニトインナトリウム水和物	抗けいれん剤
採用	ホスホマイシン N a 静注用 2 g 「タカタ」	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質製剤
採用	ホスミシン錠 5 0 0	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン系抗生物質製剤
採用	ボスミン外用液 0 . 1 %	アドレナリン	アドレナリン液
採用	ボスミン注 1 m g	アドレナリン	アドレナリン注射液
採用	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	経口リン酸製剤
採用	ホスレノール O D 錠 2 5 0 m g	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤
採用	ポテリジオ点滴静注 2 0 m g	モガムリズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ボトックス注用 1 0 0 単位	A 型ボツリヌス毒素	A 型ボツリヌス毒素製剤
採用	ボトックス注用 5 0 単位	A 型ボツリヌス毒素	A 型ボツリヌス毒素製剤
採用	ボナロン経口ゼリー 3 5 m g	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
採用	ボノテオ錠 5 0 m g	ミノドロロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
採用	ポビドンヨードガーグル液 7 % 「ケンエー」	ポビドンヨード	含嗽剤
採用	ポビドンヨードスクラブ液 7 . 5 % 「明治」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
採用	ポビドンヨード外用液 1 0 % 「明治」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
採用	ポピョドンゲル 1 0 %	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
採用	ポプスカイン 0 . 2 5 % 注シリンジ 2 5 m g ／ 1 0 m L	レボブピバカイン塩酸塩	長時間作用性局所麻酔剤
採用	ポプスカイン 0 . 2 5 % 注バッグ 2 5 0 m g ／ 1 0 0 m L	レボブピバカイン塩酸塩	長時間作用性局所麻酔剤
採用	ボラザ G 坐剤	トリベノシド・リドカイン	痔核局所治療剤
採用	ボラザ G 軟膏	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤
採用	ボララミン錠 2 m g	d - クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
採用	ポリスチレンスルホン酸 C a 経口ゼリー 2 0 % 分包 2 5 g 「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤
採用	ホリゾン散 1 %	ジアゼパム	マイナーTRANクライザー
採用	ポリドカスクレロール 3 % 注 2 m L	ポリドカノール	下肢静脈瘤硬化剤
採用	ポリミキシシン B 硫酸塩錠 1 0 0 万単位「ファイザー」	ポリミキシシン B 硫酸塩	ポリペプチド系抗生物質
採用	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第 X I I I 因子	血漿分画製剤
採用	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第 X I I I 因子	血漿分画製剤
採用	ボルベン輸液 6 %	ヒドロキシエチルデンプン 1 3 0 0 0 0	代用血漿剤
採用	ボンビバ静注 1 m g シリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
採用	マーカイン注 0 . 5 %	ブピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
採用	マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
採用	マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
採用	マーズレン S 配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L - グルタミン	胃炎・潰瘍治療剤
採用	マイスタン細粒 1 %	クロバザム	抗てんかん剤
採用	マイテラーゼ錠 1 0 m g	アンペノニウム塩化物	重症筋無力症治療剤
採用	マイトマイシン眼科外用液用 2 m g	マイトマイシン C	眼科用マイトマイシン C 製剤
ハイアート	マイトマイシン注用 2 m g	マイトマイシン C	抗悪性腫瘍剤
採用	マキュエイド眼注用 4 0 m g	トリアムシノロンアセトニド	眼科手術補助剤，眼科用副腎皮質ホルモン剤
採用	マグコロール散 6 8 % 分包 5 0 g	クエン酸マグネシウム	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤
採用	マグセント注 1 0 0 m L	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	マグネスコープ静注 3.8%シリンジ 10mL	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤
採用	マグネスコープ静注 3.8%シリンジ 15mL	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤
採用	マグネスコープ静注 3.8%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤
採用	マルトス輸液 10%	マルトース水和物	二糖類・糖質補給剤
試用	マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
採用	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
採用	ミールビック	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	
採用	ミオコールスプレー 0.3mg	ニトログリセリン	ニトログリセリン舌下スプレー剤
試用	ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤	心臓外科手術用心停止・心筋保護液
採用	ミカファンギンNa点滴静注用 50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
採用	ミカムロ配合錠 AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤
採用	ミケランLA点眼液 2%	カルテオロール塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
ハイアート	ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミダゾラム	催眠鎮静剤
ハイアート	ミダフレッサ静注 0.1%	ミダゾラム	抗けいれん剤
採用	ミドリンM点眼液 0.4%	トロピカミド	調節麻痺・散瞳点眼剤
採用	ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	検査用散瞳点眼剤
採用	ミニリンメルトOD錠 60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	ペプチイド系抗利尿ホルモン用剤
採用	ミネプロOD錠 2.5mg	エサキセレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
採用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」	ミノサイクリン塩酸塩	歯周炎治療剤
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
採用	ミヤBM細粒	酪酸菌製剤	生菌製剤
採用	ミヤBM錠	酪酸菌製剤	生菌製剤
採用	ミリブラ動注用 70mg	ミリブラチン水和物	肝細胞癌治療剤
採用	ミリブラ用懸濁用液 4mL	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	ミリブラ動注用専用懸濁液
採用	ミルセラ注シリンジ 100μg	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ミルセラ注シリンジ 150μg	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ミルセラ注シリンジ 25μg	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ミルセラ注シリンジ 50μg	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ミルセラ注シリンジ 75μg	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
採用	ミルリノン注 10mg「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
採用	ミンクリア内用散布液 0.8%	ローメントール	胃蠕動運動抑制剤
採用	ムコフィリン吸入液 20%	アセチルシステイン	気道粘液溶解剤
採用	メiakトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	セフェム系抗生物質
採用	メイラックス錠 1mg	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定剤
採用	メイロン静注 8.4%	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
採用	メイロン静注 8.4%	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
採用	メインテート錠 0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
採用	メインテート錠 2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
採用	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
採用	メサデルム軟膏 0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
採用	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	鎮咳剤
採用	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	重症筋無力症治療剤
採用	メソトレキセート錠 2.5mg	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
採用	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
採用	メソトレキセート点滴静注液 200mg	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
採用	メチコバル錠 500μg	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤
採用	メチコバル注射液 500μg	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤
採用	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 0.125mg「F」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮止血剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	メチルエルゴメトリン注0. 2 m g 「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮止血剤
採用	メトグルコ錠2 5 0 m g	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
採用	メトクロプラミド錠5 m g 「トーワ」	メトクロプラミド	消化器機能異常治療剤
採用	メトリジン錠2 m g	ミドドリン塩酸塩	低血圧治療剤
採用	メナテトレノンカプセル1 5 m g 「トーワ」	メナテトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミンK 2 剤
採用	メネシット配合錠1 0 0	レボドパ・カルビドパ水和物	抗パーキンソン剤
採用	メプチンエアー1 0 μ g 吸入1 0 0 回	プロカテロール塩酸塩水和物	定量噴霧式気管支拡張剤
採用	メプチン吸入液ユニット0. 3 m L	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
採用	メマリーOD錠2 0 m g	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
採用	メルカゾール錠5 m g	チアマゾール	抗甲状腺剤
採用	メロペネム点滴静注用0. 2 5 g 「明治」	メロペネム水和物	カルバペネム系抗生物質
採用	メロペネム点滴静注用0. 5 g 「明治」	メロペネム水和物	カルバペネム系抗生物質
採用	メンタックスクリーム1 %	ブテナフィン塩酸塩	抗白癬菌剤
採用	メンタックス外用液1 %	ブテナフィン塩酸塩	抗白癬菌剤
採用	モーラスパップXR2 4 0 m g	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
採用	モノヴァー静注1 0 0 0 m g	デルイソマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤
採用	モビコール配合内用剤L D	マクロゴール4 0 0 0 ・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	慢性便秘症治療剤
採用	モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	経口腸管洗浄剤
採用	モルヒネ塩酸塩錠1 0 m g 「D S P」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
採用	モルヒネ塩酸塩注射液1 0 m g 「タケダ」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包1 0 m g 「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
採用	モンテルカスト錠1 0 m g 「KM」	モンテルカストナトリウム	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
採用	ヤーボイ点滴静注液5 0 m g	イピリマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
採用	ユービット錠1 0 0 m g	尿素（1 3 C）	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
採用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4 g	滅菌調整タルク	悪性胸水治療剤
採用	ユニフィルLA錠2 0 0 m g	テオフィリン	気管支拡張剤
採用	ユベラ錠5 0 m g	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE 剤
採用	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA 油	外用ビタミンE ・A 剤
採用	ユリーフOD錠4 m g	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
採用	ユリス錠1 m g	ドチヌラド	高尿酸血症治療剤
採用	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤
採用	ヨウ化カリウム丸5 0 m g 「日医工」	ヨウ化カリウム	無機質製剤
採用	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	殺菌消毒剤
ハイアート	ヨンデリス点滴静注用0. 2 5 m g	トラベクテジン	抗悪性腫瘍剤
ハイアート	ヨンデリス点滴静注用1 m g	トラベクテジン	抗悪性腫瘍剤
採用	ラクツロースシロップ6 5 % 「タカタ」	ラクツロース	高アンモニア血症・腸管機能改善剤
採用	ラゲブリオカプセル2 0 0 m g	モルヌピラビル	抗ウイルス剤
採用	ラコールNF 配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
採用	ラコールNF 配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
採用	ラジカット点滴静注バッグ3 0 m g	エダラボン	脳保護剤
採用	ラステットSCapセル2 5 m g	エトポシド	抗悪性腫瘍剤
採用	ラツード錠4 0 m g	ルラシドン塩酸塩	抗精神病剤／双極性障害のうつ症状治療剤
採用	ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	整腸剤
仮採用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット1 0 m g ／m L 「センジュ」	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	眼科用V E G F 阻害剤
採用	ラニラピッド錠0. 0 5 m g	メチルジゴキシン	強心配糖体製剤
採用	ラピアクタ点滴静注液バイアル1 5 0 m g	ペラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
採用	ラミシールクリーム1 %	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
採用	ラミシール錠1 2 5 m g	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
採用	ラメルテオン錠8 m g 「武田テバ」	ラメルテオン	メラトニン受容体アゴニスト
採用	ラモトリギン錠2 5 m g 「トーワ」	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬
採用	ランタスXR注シロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
採用	ランマーク皮下注1 2 0 m g	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗R A N K L モノクローナル抗体製剤
採用	リアルダ錠1 2 0 0 m g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
採用	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤
採用	リーマス錠1 0 0	炭酸リチウム	躁病・躁状態治療剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	リウマトレックスカプセル2 m g	メトトレキサート	抗リウマチ剤
採用	リオナ錠2 5 0 m g	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症治療剤
採用	リオレサール錠5 m g	バクロフェン	抗痙縮剤
試用	リクシアナOD錠1 5 m g	エドキサバントシル酸塩水和物	経口F X a 阻害剤
採用	リクシアナOD錠3 0 m g	エドキサバントシル酸塩水和物	経口F X a 阻害剤
採用	リクシアナOD錠6 0 m g	エドキサバントシル酸塩水和物	経口F X a 阻害剤
採用	リクラスト点滴静注液5 m g	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
採用	リコモジュリン点滴静注用1 2 8 0 0	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	血液凝固阻止剤
採用	リサイオ点滴静注液1 0 0 m g	チオテパ	造血幹細胞移植前治療剤
採用	リザベンカプセル1 0 0 m g	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
採用	リザベンドライシロップ5 %	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
採用	リスパダール コンスタ筋注用2 5 m g	リスペリドン	持効性抗精神病剤
採用	リスパダール錠1 m g	リスペリドン	抗精神病剤
採用	リスペリドン内用液1 m g／m L 「ヨシトミ」	リスペリドン	抗精神病剤
採用	リスミー錠2 m g	リルマザホン塩酸塩水和物	睡眠誘導剤
採用	リスモダンP 静注5 0 m g	ジソピラミドリン酸塩	不整脈治療剤
採用	リスモダンR錠1 5 0 m g	ジソピラミドリン酸塩	徐放性不整脈治療剤
採用	リゾビスト注	フェルカルボトラン	M R I 用肝臓造影剤
採用	リツキシサン点滴静注1 0 0 m g	リツキシマブ（遺伝子組換え）	抗C D 2 0モノクローナル抗体
採用	リツキシサン点滴静注5 0 0 m g	リツキシマブ（遺伝子組換え）	抗C D 2 0モノクローナル抗体
仮採用	リツキシマブB S点滴静注1 0 0 m g 「KH K」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	抗C D 2 0モノクローナル抗体
仮採用	リツキシマブB S点滴静注5 0 0 m g 「KH K」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	抗C D 2 0モノクローナル抗体
採用	リドカイン静注用2 %シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
採用	リトドリン塩酸塩錠5 m g 「あすか」	リトドリン塩酸塩	切迫流・早産治療剤
採用	リトドリン塩酸塩点滴静注液5 0 m g 「あすか」	リトドリン塩酸塩	切迫流・早産治療剤
採用	リドメックスコーワクリーム0. 3 %	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
採用	リドメックスコーワローション0. 3 %	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
採用	リドメックスコーワ軟膏0. 3 %	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
採用	リパクレオンカプセル1 5 0 m g	パンクレリパーゼ	膵消化酵素補充剤
採用	リバスタッチパッチ1 8 m g	リバスタグミン	アルツハイマー型認知症治療剤
採用	リピオドール4 8 0 注1 0 m L	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機器の調整用剤
採用	リピディル錠8 0 m g	フェノフィブラート	高脂血症治療剤
採用	リファンピシнкаプセル1 5 0 m g 「サンド」	リファンピシン	リファンピシン製剤
採用	リフキシマ錠2 0 0 m g	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤
採用	リフレックス錠1 5 m g	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
採用	リベルサス錠3 m g	セマグルチド（遺伝子組換え）	2 型糖尿病治療剤
採用	リボトリール細粒0. 1 %	クロナゼパム	抗てんかん剤
採用	リボトリール錠0. 5 m g	クロナゼパム	抗てんかん剤
採用	リマチル錠1 0 0 m g	ブシラミン	抗リウマチ剤
採用	リマプロストアルファデクス錠5 μ g 「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	P G E 1 誘導体制剤
採用	リュウアト1 %眼軟膏	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳・調節麻痺剤
採用	リュープリンP R O注射用キット2 2. 5 m g	リュープロレリン酢酸塩	L H－R H誘導体徐放性製剤
採用	リュープリンS R注射用キット1 1. 2 5 m g	リュープロレリン酢酸塩	L H－R H誘導体徐放性製剤
採用	リュープリン注射用キット3. 7 5 m g	リュープロレリン酢酸塩	L H－R H誘導体徐放性製剤
採用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 8 8 m g 「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	L H－R H誘導体徐放性製剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	リルテック錠50	リルゾール	筋萎縮性側索硬化症用剤
採用	リレンザ	ザナミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
採用	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
採用	リンデロンーDPクリーム	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
採用	リンデロンーVGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
採用	リンデロンーVGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
採用	リンデロンーVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
採用	リンデロン懸濁注	ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	リンデロン注2mg（0.4%）	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	リン酸Na補正液0.5mmol／mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液
採用	ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	抗精神病剤
採用	ルセフィODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	2型糖尿病治療剤
採用	ルセンチス硝子体内注射液10mg／mL	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
採用	ルティナス腔錠100mg	プロゲステロン	黄体ホルモン製剤
採用	ルトラル錠2mg	クロルマジノン酢酸エステル	黄体ホルモン剤
採用	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
採用	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
採用	ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	抗真菌剤
採用	ルリッド錠150	ロキシスロマイシン	酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤
採用	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	抗精神病剤
採用	レキソタン錠2	ブロマゼパム	精神神経用剤
採用	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー
採用	レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬
採用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	腹膜透析液	腹膜透析液
採用	レクサプロ錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
採用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤
採用	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	皮膚疾患治療剤
採用	レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル	レストレスレッグス症候群治療剤
採用	レクビオ皮下注300mgシリンジ	インクリシランナトリウム	持続性LDLコレステロール低下siRNA製剤
試用	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体
試用	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体
採用	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
採用	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	アレルギー性疾患治療剤
採用	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
採用	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	未熟児無呼吸発作治療剤
採用	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
採用	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤
採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	胃炎・胃潰瘍治療剤
採用	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗造血器悪性腫瘍剤
採用	レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
採用	レペタン注0.3mg	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
採用	レベトールカプセル200mg	リバビリン	抗ウイルス剤
採用	レベミル注フレックスペン	インスリン デテムル（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	レボフロキサシン点滴静注 5 0 0 m g ／ 2 0 m L 「 D S E P 」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
採用	レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「 N P 」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
採用	レボレード錠 1 2 . 5 m g	エルトロンボパグ オラミン	経口造血刺激薬
採用	レミケード点滴静注用 1 0 0	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒト T N F α モノクローナル抗体製剤
採用	レミッチ O D 錠 2 . 5 μ g	ナルフラフィン塩酸塩	そう痒症改善剤
採用	レミニール O D 錠 8 m g	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
採用	レミフェンタニル静注用 5 m g 「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
採用	レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息・ C O P D 治療配合剤
採用	レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
採用	レルミナ錠 4 0 m g	レルゴリクス	G n R H アンタゴニスト
採用	レンビマカプセル 1 0 m g	レンバチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	レンビマカプセル 4 m g	レンバチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	ロイケリン散 1 0 %	メルカプトプリン水和物	白血病治療剤
採用	ロイコボリン錠 5 m g	ホリナートカルシウム	抗葉酸代謝拮抗剤
採用	ロイナーゼ注用 1 0 0 0 0	L - アスパラギナーゼ	抗悪性腫瘍酵素製剤
採用	ロイナーゼ注用 5 0 0 0	L - アスパラギナーゼ	抗悪性腫瘍酵素製剤
採用	ローヘパ透析用 2 0 0 単位／ m L シリンジ 2 0 m L	パルナパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
採用	ロキソプロフェン N a テープ 1 0 0 m g 「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
採用	ロキソプロフェン N a パップ 1 0 0 m g 「 N P 」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
採用	ロキソプロフェン N a 錠 6 0 m g 「トーワ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤
採用	ロケルマ懸濁用散分包 5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善剤
採用	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	経皮吸収型鎮痛消炎剤
採用	ロコイドクリーム 0 . 1 %	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
採用	ロサルタン K 錠 5 0 m g 「 D S E P 」	ロサルタンカリウム	A - I I アンタゴニスト
採用	ロソーゼット配合錠 H D	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／ H M G - C o A 還元酵素阻害剤配合剤
採用	ロスバスタチン O D 錠 5 m g 「 D S E P 」	ロスバスタチンカルシウム	H M G - C o A 還元酵素阻害剤
ハイアート	ロゼウス静注液 1 0 m g	ビノレルビン酒石酸塩	ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
ハイアート	ロゼウス静注液 4 0 m g	ビノレルビン酒石酸塩	ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
採用	ロトリガ粒状カプセル 2 g	オメガー 3 脂肪酸エチル	E P A ・ D H A 製剤
採用	ロナセンテープ 4 0 m g	ブロナンセリン	抗精神病剤
採用	ロナセン錠 4 m g	ブロナンセリン	抗精神病剤
採用	ロピオン静注 5 0 m g	フルルビプロフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
採用	ロペミン小児用細粒 0 . 0 5 %	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤
採用	ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g 「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤
採用	ロラゼパム錠 0 . 5 m g 「サワイ」	ロラゼパム	マイナートランキライザー
採用	ロンサーフ配合錠 T 1 5	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
採用	ロンサーフ配合錠 T 2 0	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
採用	ワーファリン錠 1 m g	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
採用	ワーファリン顆粒 0 . 2 %	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
採用	ワイスタール配合静注用 1 g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β - ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
採用	ワコビタール坐剤 5 0	フェノバルビタールナトリウム	催眠・鎮静・抗けいれん剤
採用	ワソラン錠 4 0 m g	ベラパミル塩酸塩	不整脈・虚血性心疾患治療剤
採用	ワソラン静注 5 m g	ベラパミル塩酸塩	C a 拮抗性不整脈治療剤
採用	ワンアルファ錠 1 . 0 μ g	アルファカルシドール	活性型ビタミン D 3 製剤
採用	エフェドリン「ナガサ」注射液 4 0 m g	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤
採用	亜鉛華（ 1 0 % ）単軟膏「ヨシダ」	亜鉛華	収斂・消炎・保護剤
採用	一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g 「サワイ」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用 I S M N 製剤
採用	一般診断用精製ツベルクリン（ P P D ） 1 人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤
採用	塩化カリウム	塩化カリウム	塩化カリウム製剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬（食塩）
採用	加香ヒマシ油「東海」	加香ヒマシ油	下剤
採用	乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニ チヤク」	乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン	血漿分画製剤
採用	乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチ ヤク」	乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン	血漿分画製剤
採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン	
採用	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生風しんワクチン	
採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しんワクチン	
採用	逆性石ケン液０．０２５「ヨシダ」	ベンザルコニウム塩化物	殺菌消毒剤
採用	強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ	グリチルリチン・グリシン・システイン配合 剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
採用	献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ 「ＫＭＢ」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
採用	献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ ｍＬ「ベネシス」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
採用	献血ヴェノグロブリンⅠＨ１０％静注２．５ ｇ／２５ｍＬ	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリ ン	血漿分画製剤
採用	献血ヴェノグロブリンⅠＨ１０％静注５ｇ／ ５０ｍＬ	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリ ン	血漿分画製剤
採用	献血グロベニン－Ⅰ静注用２５００ｍｇ	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ ブリン	血漿分画製剤
採用	献血グロベニン－Ⅰ静注用５０００ｍｇ	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ ブリン	血漿分画製剤
採用	献血ノンスロン１５００注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅠⅠⅠ	血液凝固阻止剤
採用	献血ベニロン－Ⅰ静注用５０００ｍｇ	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血漿分画製剤
採用	光糖液２０％	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「Ｊ Ｂ」	乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン	血漿分画製剤
採用	産婦人科用イソジンクリーム５％	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
採用	酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
採用	歯科用キシロカインカートリッジ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
採用	歯科用シタネストーオクタプレシンカート リッジ	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	局所麻酔剤
採用	歯科用ヨード・グリセリン	ヨード・グリセリン	有機殺菌消毒剤
採用	重質酸化マグネシウム〈ハチ〉	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
採用	硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコ ク」	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
採用	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナト リウム	便秘治療剤
採用	酢酸「ニッコー」	酢酸	皮膚軟化剤
採用	酢酸亜鉛錠５０ｍｇ「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤
採用	水溶性プレドニン２０ｍｇ	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
採用	生食注シリンジ「ＮＰ」	生理食塩液	生理食塩液
採用	生食注シリンジ「ＮＰ」	生理食塩液	生理食塩液
採用	生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」	生理食塩液	生理食塩液
採用	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	生理食塩液
採用	生理食塩液ＰＬ「フソー」	生理食塩液	生理食塩液
採用	精製ラノリン	精製ラノリン	軟膏基剤
採用	静注用キシロカイン２％	リドカイン	抗不整脈剤
採用	静注用フローラン０．５ｍｇ	エポプロステノールナトリウム	ＰＧＩ２製剤
採用	大塚塩カル注２％	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
採用	大塚蒸留水	注射用水	注射用水
採用	大塚蒸留水	注射用水	注射用水
ハイアート	大塚食塩注１０％	塩化ナトリウム	電解質補給液
採用	大塚生食注	生理食塩液	生理食塩液
採用	大塚生食注	生理食塩液	生理食塩液
採用	大塚生食注	生理食塩液	生理食塩液
採用	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	生理食塩液	注入針付溶解剤

採用区分	薬品名称	一般名称	標榜薬効
採用	大塚糖液 5 %	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	大塚糖液 5 %	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	大塚糖液 5 %	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	大塚糖液 5 0 %	精製ブドウ糖	糖類製剤
採用	単シロップ	単シロップ	矯味剤
採用	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤
採用	注射用G H R P 科研 1 0 0	プラルモレリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
採用	注射用イホマイド 1 g	イホスファミド	抗悪性腫瘍剤
採用	注射用エフオーワイ 1 0 0	ガベキサートメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
採用	注射用エンドキサン 1 0 0 m g	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
採用	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
ハイアート	注射用サイメリン 5 0 m g	ラニムスチン	抗悪性腫瘍剤
ハイアート	注射用フィルデシン 1 m g	ビンデシン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
採用	注射用メソトレキセート 5 0 m g	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
採用	注射用メソトレキセート 5 m g	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
採用	注射用水 P L 「フソー」	注射用水	注射用水
採用	注射用水バッグ「フソー」	注射用水	注射用水
採用	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	総合ビタミン剤
採用	沈降炭酸カルシウム錠 5 0 0 m g 「三和」	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
採用	低分子デキストラン L 注	乳酸リンゲル液（デキストラン 4 0 加）	血漿増量・体外循環灌流液
採用	点滴静注用ホスカビル注 2 4 m g ／m L	ホスカルネットナトリウム水和物	抗ウイルス化学療法剤
採用	動注用アイエーコール 5 0 m g	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
採用	日点アトロピン点眼液 1 %	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳・調節麻痺剤
採用	乳酸カルシウム「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤
採用	乳糖水和物「ホエイ」	乳糖水和物	賦形剤
採用	尿素「コザカイ・M」	尿素	調剤用剤
採用	尿素クリーム 2 0 % 「S U N」	尿素	角化症治療剤
採用	白色ワセリン＊（日興製薬）	白色ワセリン	軟膏基剤
採用	白色ワセリン「ケンエー」	白色ワセリン	軟膏基剤
採用	氷酢酸「東豊」	氷酢酸	皮膚軟化剤
採用	無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	殺菌消毒剤
採用	無水エタノール注「V T R S」	無水エタノール	
採用	滅菌精製水＊（日興製薬）	滅菌精製水	溶解剤
採用	薬用炭「日医工」	薬用炭	止瀉・整腸剤
採用	流動パラフィン「マルイシ」	流動パラフィン	軟膏基剤
採用	硫酸 M g 補正液 1 m E q ／m L	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
採用	腓外分泌機能検査用 P F D 内服液 5 0 0 m g	ベンチロミド	膵機能検査用試薬